Schweiz. Z. Path. Bakt. 1955;18:1257

Un cas de maladie de Letterer-Siwe chez le nouveau-né

H.

Bonstein

(Lausanne)

L'observation concerne un enfant qui présentait à la naissance une dermatite vésiculeuse et purpurique due à des proliférations intradermiques de cellules de type réticulo-endothélial. A l'autopsie on retrouve les mêmes cellules dans le thymus, les ganglions lymphatiques, la rate et le foie. C'est le 4^e cas décrit de maladie de Letterer-Siwe où les lésions sont aussi précoces. On relève dans la littérature quatre observations de tumeurs thymiques qui paraissent être en fait des réticuloses aiguës.

Discussion.

Zollinger: Die Diagnose eines Letterer-Siwe ist nach meiner Erfahrung äußerst schwierig und sollte wohl besser zugunsten der etwas umfassenderen Bezeichnung «maligne Reticulose des Säuglings» ersetzt werden. In einem dem vorgetragenen sehr ähnlichen Fall bekannt ich von Letterer, Siwe und anderen ganz verschiedene Diagnosen. Eindeutig scheint nur der Ausgang von Reticulose und der Malignität zu sein.

Rutishauser: In diesem Fall sollte m. E. eine Differentialdiagnose mit Urticaria pigmentosa gemacht werden.

Nicod: Que l'on parle de Letterer-Siwe, d'urticaria pigmentosa ou d'autres, cela n'a en somme guère d'importance. L'essentiel est qu'il s'agit ici d'une prolifération réticulo-endothéliale multicentrique, qui n'est pas un sarcome avec ses métastases, mais une réticulose maligne au sens large du terme, apparente dès la naissance.

Werthemann: Autor-Namen als ausschließliche Bezeichnungen für Krankheitsbilder sind zu vermeiden: Letterer betitelte seine Arbeit «Ein Beitrag zu den proliferativen Erkrankungen des R.E.S.» und Siwe: «Die Reticuloendotheliose, ein neues Krankheitsbild unter den Hepatosplenomegalien.» Welche Krankheitsbezeichnung schlägt Herr Bonstein vor?