L'utilité du cathétérisme cardiaque dans le diagnostic de la péricardite constrictive

J.-L.		Rivier
P.		Desbaillets
B.		Baudraz

(Clinique médicale, Lausanne.)

(Résumé.)

Les auteurs insistent sur l'utilité du cathétérisme dans les cas de péricardite constrictive, pour compléter la symptomatologie clinique et radiologique. Après avoir commenté les aspects caractéristiques des courbes de pression auriculaire, ventriculaire et de l'artère pulmonaire, aspects qui ont été déjà mis en évidence par Bloomfield et coll., Lagerlöf et Werkö, et T. Hansen, les auteurs relèvent l'importance de l'hypertension au niveau de l'artère pulmonaire et celle du chiffre de la pression diastolique du ventricule droit. L'étude de ces pressions permet, en effet, de déterminer si la constriction intéresse le ventricule droit seulement, ou si le ventricule gauche est également étranglé. Cela a une grande importance pour le chirurgien et est un des éléments qui le guideront dans la tactique opératoire.

Le cathétérisme pratiqué après l'intervention permet de juger de la valeur fonctionnelle de cette dernière.

(Aus der I. Med. Klinik der Med. Akademie Düsseldorf [Direktor: Prof. Dr. E. Boden].)

Differenzierung der formgestaltenden Kräfte der unipolaren Brustwandableitungen.

Von H. GILLMANN.

Nach der inzwischen von zahlreichen Untersuchern bestätigten Anschauung von Sulzer und Duchosal entsprechen die unipolaren Brustwandableitungen der Projektion des Integralvektors des ganzen Herzens auf die Verbindungslinien zwischen Elektroden und virtuellem elektrischem Nullpunkt.