Die chronische Pankreatitis im Brennpunkt zwischen pathophysiologischem Verständnis und technischen Möglichkeiten

J.

Horn

Prof. Dr. J. Horn, Chirurgische Abteilung, Städtisches Krankenhaus München-Harlachii, Sanatoriumsplatz 2, D-81545 München

Das Krankheitsbild der chronischen Pankreatitis war zuletzt 1987 Leitthema der «Chirurgischen Gastroenterologie». Aus mehreren Gründen scheint eine erneute Bestandsaufnahme der Krankheitseinschätzung, der diagnostischen Möglichkeiten und der therapeutischen Konsequenzen geboten. Neben der Beobachtung, daß die Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse weltweit an Häufigkeit zunehmen, gilt es immer wieder, neue technische Errungenschaften auf ihre Praktikabilität und Sinnhaftigkeit zu überprüfen. Unabhängig davon gibt es auch weiterhin eine Reihe ungeklärter Fragen im Zusammenhang mit der Entstehung der chronischen Pankreatitis der jeweiligen ätiologischen Zuordnung, dem Verständnis gegenüber den die Erkrankung propagierenden Faktoren sowie den Möglichkeiten der therapeutischen Beeinflussbarkeit.

Es stellen sich Fragen hinsichtlich der Einschätzung des Spontanverlaufes, der Häufigkeit und der möglichen Kausalität karzinomatöser Entartungen sowie hinsichtlich des Stellenwertes interventioneller und operativer Therapiemaßnahmen. Weitgehend unbeantwortet sind auch heute noch Fragen einer möglichen Prävention. Die Bedeutung des Alkohols als initiierender und propagierender Faktor ist zwar allgemein anerkannt [1], doch erklärt er nicht alles und schon gar nicht in jedem Fall. Zu wenig wissen wir über die ätiologischen Zusammenhänge im Sammeltopf der «idiopathischen» Erkrankung, zu wenig sind die Ursachen untersucht, die für das Fortschreiten des Krankheitsprozesses und für die bindegewebige Transformation des Parenchyms verantwortlich zu machen sind.

Die Versuche, die verschiedenen Formen der chronischen Entzündung klassifizierend zu ordnen, beziehen sich auch heute noch eher auf phänotypische Merkmale, als daß sie geeignet wären, wirkliche Entitäten zu definieren [2]. Noch scheint es nicht endgültig geklärt, ob auch rezidivierende Schübe einer akuten Pankreatitis zum Erscheinungsbild der chronischen Pankreatitis führen können [3]. Auf diese Weise muß auch die Bedeutung des möglichen biliären Faktors für die Entstehung der chronischen Pankreatitis offen bleiben. Die Fragen, die sich auf die Anfänge der Erkrankung beziehen, die sich häufig in diskriminierender Absicht auf die unterschiedliche Morphologie der Spätphase beziehen, projizieren sich gleichermaßen auf die Möglichkeiten der therapeutischen Einflußnahme. Obwohl die obstruktive Komponente im Verlauf der chronischen Pankreatitis immer wieder betont wird [2], bleibt zu fragen, ob ihr bei den therapeutischen Überlegungen gebührend Aufmerksamkeit geschenkt wird. Als Gradmesser für den operativen Therapieerfolg fungiert die Beeinflussbarkeit des therapierefraktären Schmerzes. Zwar gibt es unterschiedliche Vorstellungen über die Schmerzgenese bei der chronischen Pankreatitis, doch scheint die

Obstruktion mit der konsekutiven intraduktalen Druckerhöhung eine wesentliche Schmerzverursachung darzustellen. Neben dem konservativen Therapieansatz, durch eine Verminderung der Sekretion mittels Enzymsubstitution auf die Schmerzen Einfluß zu nehmen [4], deuten die immer wieder nachzuweisenden Erfolge nach Drainageoperationen auf die Richtigkeit der Annahme einer obstruktiv verursachten Schmerz-entstehung [5]. Die Frage allerdings, in-wieweit durch eine Drainageoperation auch Einfluß auf die Progredienz der Erkrankung genommen werden kann, ist noch nicht endgültig beantwortet [6]. Vieles jedoch spricht dafür, daß die im Rahmen einer chronischen Pankreatitis oft-mals entstehende Obstruktion, verursacht durch Stenosen, Zysten oder Konkrement-bildungen, eine zusätzliche Entzündungs-aggravation bewirkt, die durch geeignete operative Maßnahmen neutralisiert werden kann [7]. Immer häufiger wird darüber berichtet, daß es infolge verbesserter technischer Möglichkeiten auch auf interventionellem Wege möglich ist, Unwegsamkeiten im Bereich des Hauptganges zu beseitigen [8, 9]. Der Fortschritt der Technik ist bestechend, es wäre wünschenswert, wenn sich die Abwägungen zwischen Indikation und therapeutischer Zielsetzung stets vom pathophysiologischen Verständnis her leiten ließen. Technik und Wissen machen den Fachmann aus. Mit Wissen allein ist dem Patienten nicht geholfen, mit Technik allein kann er Schaden erleiden. Noch manche kritische Bewertung wird notwendig sein, um der stürmischen Entwicklung der Technik zu ihrem eigentlichen Erfolg zu verhelfen [10, 11]. Ein Erfolg ist allemal

KARGER

© 1996 S. Karger GmbH, Freiburg Fax (0761) 45207 14

eine Operation, die nicht mehr durchgeführt zu werden braucht. Bei der Beurteilung des gesamten Krankheitsverlaufes weist Ammann immer wieder auf die Möglichkeit der spontanen Schmerzfreiheit im Endstadium der Erkrankung hin (burning out) [12]. Er überblickt ein umfangreiches und selten gut dokumentiertes Krankengut, welches ihm die Möglichkeit gibt, morphologische Veränderungen den funktionellen Entwicklungen einerseits und der klinischen Befindlichkeit andererseits zuzuordnen. Halt man die Untersuchungsergebnisse von Lankisch et al. [13] dagegen, dann stellen sich Fragen nach der Homogenität der Kollektive, nach der Vergleichbarkeit des Krankengutes, nach der Stringenz der Schlußfolgerungen.

So schließt sich der Kreis mit der Frage nach der Entität bzw. den Entitäten der chronischen Pankreatitis: Ist die Polymorphie dieser Erkrankung lediglich Ausdruck einer individuell unterschiedlichen Manifestation bzw. Progression, oder aber verbergen sich unterschiedliche Erkrankungen hinter dem Erscheinungsbild der im Endstadium nachzuweisenden bindegewebigen Transformation? Es gibt genügend Gründe, sich immer wieder mit dem Krankheitsbild der chronischen Pankreatitis auseinanderzusetzen.

Literatur

- Schmidt DN: Apparent risk factors for chronic and acute pancreatitis in Stockholm County. Int J Pancreatol 1991;8:45.
- Sarless H: Definition and classifications of pancreatitis. Pancreas 1991 ;6:470.
- Klöppel G, Maillet B: Pseudocysts in chronic pancreatitis: A morphological analysis of 57 resection specimens and 9 autopsy pancreata. Pancreas 1991;6:266.

Jhse I, Permeth J: Enzyme supplementation for pain in chronic pancreatitis; in Beger HG, Büchler, Dit-schuneit H, Malfertheiner P (eds): Chronic Pancreatitis. Berlin. Springer, 1990.

Widdison AL, Alvarze C, Karanjia ND, Reber HA: Experimental evidence of beneficial effects of ductal decompression in chronic pancreatitis. Endo-scopy 1991;23:151.

Nealon WH, Tompson JC: Progressive loss of pancreatic function in chronic pancreatitis is delayed by main pancreatic duct decompression: A longitudinal prospective analysis of the modified Puestow procedure. Ann Surg 1993;217:458.

Horn J: Die operative Behandlung der chronischen Pankreatitis. Kritische Anmerkungen zur revidierten Marseille-Klassifikation der Pankreatitis von 1984. Chir Gastroenterol 1993;9:376.

Cremier M, Deviere J, Dumonceau J-M, et al: En-doscopic management of chronic pancreatitis. Dig Surg 1994; 11:290.

Linder S, Engstrom C-F, Rosen AV, Wiechel K-L: Endoscopic clearance of the pancreatic duct in chronic pancreatitis with severe pain. Surg Endosc 1993;7:37.

Ammann RW: A critical appraisal of interventional therapy in chronic pancreatitis. Endoscopy 1991; 23:191.

Malfertheiner P, Büchler M: Indications for endoscopic or surgical therapy in chronic pancreatitis. Endoscopy 1991;23:185.

Ammann RW: Natural history of chronic pancreatitis. Dig Surg 1994;11:267.

Lankisch PG, Lohr-Happe A, Otto J, Creutzfeld W: Natural course in chronic pancreatitis. Digestion 1993;54:145.

180

Chir Gastroenterol 1996; 12:179-180

Horn

aum ein anderes Videosystem dürfte der Anforderung nach einer realistischen und objektiven Bildwiedergabe besser gerecht werden, als die **Dyonics Digital 3-Chip**. Eine naturgetreue Farb-reproduktion, basierend auf Farbseparation durch 3-Chip-Technologie, sowie eine brillante Tiefenschärfe sind die herausragenden Eigenschaften dieses Systems. Eine absolut gleichmäßige Bildausleuchtung rundet das System ab.

Besonderen Wert wurde auf den Anwender-komfort gelegt. Der Kamerakopf gehört mit einem Gewicht von lediglich 85g zu den leichtesten – Single-Chip Systeme eingeschlossen. Die Ausstattung des Steuergerätes läßt keine Wünsche offen. Durch die digitale Bildverarbeitung werden Leistungs- und somit Qualitätsverluste entscheidend reduziert. Auch nach Jahren des Betriebs, garantiert Ihnen die digitale Signalverarbeitung eine Bildqualität wie am ersten Tag. Die parallel ausgeführten Ausgänge lassen selbst die Dokumentation auf Beta-cam zu. Sie haben alle Möglichkeiten – was Sie daraus machen, liegt ganz bei Ihnen.

FORSCHEN FÜR DIE MEDIZIN

Smith & Nephew GmbH

Surgical Division

Osterbrooksweg 71 · 22869 Schenefeld/Hamburg Telefon: 040/83 90 0338 · Telefax: 040/830 70 26

i^WMI

-SJ³/₄1¹/₈i Comrol

m

•—> €g^Bl
i/sa³/sa *- -;

Smith Nephew

‘S»
fwei