Lumbale Sympathektomie/Sympathikolyse in der Therapie der arteriellen Verschußkrankheit – Kommentar

U.		Mittelkötter ^a
W.		Kozushek ^b

Abteilung Gefäßchirurgie, Chirurgische Klinik und Poliklinik, Universität Würzburg
Chirurgische Klinik, Ruhr-Universität, Knappschafts Krankenhaus Bochum

Dr. U. Mittelkötter, Abteilung Gefäßchirurgie, Chirurgische Klinik und Poliklinik, Universität Würzburg, Josef-Schneider-Straße 2, D-97080 Würzburg

Das autonome Nervensystem nimmt mit dem sympathischen Teil eine zentrale Stellung in der Regulation des Herz-Kreislauf-Systems ein. Es steuert unter anderen Regelgrößen den peripheren Gefäßwiderstand und damit den Blutdruck im Gefäßsystem. Über die Erweiterung des Gefäßquerschnittes (entsprechend Senkung des peripheren Widerstands) wird der Durchfluß einer höheren Blutmenge pro Zeiteinheit möglich. Dieser Umstand ist für die Therapie der peripheren arteriellen Verschußkrankheit (pAVK) dann von Bedeutung, wenn chirurgisch-rekonstruktive Maßnahmen im Stadium III bzw. IV nach Fontaine einer pAVK nicht mehr gegeben sind [1-4].

Die Senkung des peripheren Widerstands darf jedoch nicht den Druckbereich unterschreiten, der für eine Perfusion des Stromgebietes erforderlich ist (entsprechend kritischer Verschußdruck). Bei pAVK und Diabetes mellitus ist mit einer sogenannten Auto-sympathektomie, insbesondere bei den Patienten mit diabetischer Neuropathie, zu rechnen, so daß in diesen Fällen durch Verfahren wie Acetylcholin-Schweißtest, Periduralanästhesie, Hautthermo-metrie und transkutane pO₂-Messung eine Prüfung des sympathischen Nervensystems vor einer Operation erforderlich wird, um die sogenannte Dilatationsreserve des Gefäßsystems abschätzen zu können [5-8].

Für die Indikationsstellung zur sympathischen Denervation bedeutet dies Selektion der Patienten [4, 6, 7], um durch den Eingriff keine Verschlechterung der Perfusionsverhältnisse hervorzurufen. Indikationen:

Stadium III mit Ruheschmerz und Kältegefühl.

Stadium IV der pAVK mit akraler trockener Gangrän (Nekrose).

Bei anderer Ätiologie einer chronischen Durchblutungsproblematik im Bereich der Akren wie z. B. Morbus Winiwarter-Buerger [3, 4] sowie der Kausalgie als Schmerzsyndrom ohne Perfusionsstörung kann die Sympathektomie angezeigt sein [9].

Als adjuvantes Verfahren im Rahmen einer Profundaplastik [3, 4, 7] im Stadium III und IV.

Als adjuvantes Verfahren bei femorokruralen Rekonstruktionen ist das Verfahren umstritten [10].

Kontraindikationen:

Bei akuter Ischämie ist das Verfahren der lumbalen Sympathektomie nicht indiziert, da allein durch eine Ausschaltung der sympathischen Regulation des Gefäßwiderstandes keine hinreichende Blutflußmenge zur Erhaltung des vital gefährdeten Beines erreicht werden kann. In

solchen Fällen ist eine Wiederherstellung der Strombahn bei z. B. embolisch oder thrombotisch bedingtem Gefäßverschluß auf dem Boden einer pAVK bzw. traumatisch bedingt mit Intimadisektion erforderlich.

Im Stadium IV mit Gangrän und septischer Komplikation wird aufgrund der Infektionsgefahr mit Exazerbation von einer Sympathektomie abgeraten.

Schlußfolgerungen

Die lumbale Sympathektomie als Verfahren ohne direkten chirurgisch-rekonstruktiven Ansatz ist ein erprobtes, jedoch keineswegs etabliertes Verfahren in der Behandlung der pAVK (Abb. 1). Ist die Indikationsliste mittlerweile eingegrenzt, so bleibt der Erfolg doch weiterhin vor der Operation nur ungenau voraussehbar [4, 6, 7, 11]. Erfahrungen mit reduzierter Amputationsrate sowie Abhe-

Abb. 1. CT-gesteuerte Kanülierung L3/L4. Nach Injektion: Depotkontrolle.

KARGER

© 1997 S. Karger GmbH, Freiburg Fax (0761) 45207 14 <http://www.karger.ch>

lungsraten von akralen Ulzera sowie Verbesserungen hinsichtlich der Nachweis einer Verbesserung der Patientenlebensqualität Ruhe-schmerz und Empfindung nach Sympathikusausschaltung kann dem Verfahren der lumbalen Sympathikusausschaltung einescheinen den positiven Einfluß auf das Stadium der pAVK zu bele- Etablierung und Anwendungsverbreitung in der Gefäßchirurgie si-gen [1, 12]. Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang, daß eine chern.Abhängigkeit von Grunderkrankungen wie Diabetes mellitus hinsichtlich der Erfolgsaussichten nicht gefunden worden ist [13]. Nur

Literatur

Baker DM, Lamerton AJ: Operative lumbar sympathectomy for severe lower limb ischaemia: Still a valuable treatment option. Ann R Coll Surg Engl 1994;76:285.

Collins GS, Rich NM, Glagett CP, Salander SM, Spebar MS: Clinical results of lumbar sympathectomy. Am Surg 1981;2:31-35.

Lemmens HAJ: Die Indikation zur lumbalen Sympathektomie. Angio 1989;17:46-48.

Vollmar J: Rekonstruktive Chirurgie der Arterien. Stuttgart, Thieme, 1996.

Albonico HU, Weber R, Althaus U: Auswirkungen der lumbalen Sympathektomie auf Haut und Muskeltemperatur der unteren Extremitäten. VASA 1977;7:126.

Altomare DF, Regina G, Lovreglio R, Memeo V: Acetylcholine sweat test: An effective way to select patients for lumbar sympathectomy. Lancet 1994;344:976-978.

Lantsberg L, Goldman M: Low limb sympathectomy assessed by laser Doppler blood flow and transcutaneous oxygen measurements. J Med Eng Technol 1990;14:182-183.

Weyland A, Weyland W, Lamersdorf A, En-sink FB, Hildebrandt J, Kettler D: Neurolytische Blockaden des lumbalen Grenzstranges in fort-geschrittenen Stadien der peripheren arteriellen Verschlußkrankheit. Anesthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 1993;28:420-426.

AbuRahma AF, Thaxton L, Robinson PA: Lumbar sympathectomy for causalgia secondary to lumbar laminectomy. Am J Surg 1996;171:423-426.

Sunder-Plassmann L, Abendroth D, Becker HM: Die Sympathektomie – Beitrag der Bundesrepublik Deutschland. Angio (Archiv) 1989;17:45-53.

Shuster S: Lumbar sympathectomy (letter; comment). Lancet 1994;344:1507.

Alexander JP: Chemical lumbar sympathectomy in patients with severe lower limb ischaemia. *Ulster Med J* 1994;63:137-143.

Persson AV, et al: Selection of patients for lumbar sympathectomy. *Surg Chir North Am* 1985;65:393-402.

“■

Chir Gastroenterol 1997;3:25-26
Mittelkötter/Kozuschek