„Röntyum“ ein Baryumkontrastmittel für Magen-Darm-Diagnostik

W.

Walter

Blank

Aus dem Ambulatorium für Magenranke Dr. Elsner und Dr. Ury

Berlin

Als wichtigsten Maßstab für die Brauchbarkeit eines Röntgenkontrastmittels muß man die Intensität und Schärfe der Schatten ansehen, die es liefert, eine Eigenschaft, die von dem Gehalt des Mittels an Strahlen absorbierender Substanz abhängt. Eine zweite, ebenso wichtige Forderung ist sein Wohlgeschmack. Abgesehen von der Belästigung des Patienten wird ein schlecht schmeckendes oder gar Widerwillen erregendes Mittel den Magen reflektorisch beeinflussen und die Motilität abnorm verändern. Schließlich ist zu verlangen, daß die Bereitung der Röntgenspeise einfach ist und die Suspension lange erhalten bleibt.

Von der Firma C. A. F. Kahlbaum, Chemische Fabrik Berlin-Adlershof, wird unter dem Namen „Röntyum“ ein Kontrastmittel herausgebracht, das unter dem Gesichtswinkel der oben aufgestellten Forderungen als ein Fortschritt in der Röntgendiagnostik der Magen- und Darmkrankheiten zu betrachten ist. Zunächst sei hervorgehoben, daß die Schärfe der Kontrastbilder derjenigen bei den bisher von uns erprobten Kontrastspeisen, mindestens gleichartig, wenn nicht überlegen ist. Das beruht wohl auf dem besonders hohen Gehalt des „Röntyum“ an Baryumsulfat, welches bewirkt, daß die Konturen des damit gefüllten Organs auch ohne Zuhilfenahme der Buckyblende äußerst scharf hervortreten.

Auch die zweite Forderung: Wohlgeschmack der Kontrastmahlzeit, wird beim Röntyum erfüllt durch ein Geschmackskorrigens, das vom Patienten angenehm empfunden wird, so daß sich für uns ein weiterer Zusatz von Kakao oder ähnlichen Geschmackszusätzen noch niemals als notwendig erwiesen hat. Selbst bei äußerst empfindlichen und nervösen Patienten haben wir es noch nie erlebt, daß die Röntgenspeise zurück-gewiesen oder erbrochen wurde.

Was das Röntyum weiterhin für den praktischen Gebrauch wertvoll erscheinen läßt, ist die Einfachheit der Herstellung. 200 g, die in einer Packung enthalten sind, werden unter Rühren mit so viel Wasser versetzt, daß ein nicht zu dicker, flüssiger Brei entsteht. Hierbei zeigt sich ein großer Vorteil, den das „Röntyum“ anderen Kontrastmitteln gegenüber besitzt. Es ist keineswegs erforderlich, wenngleich möglich, das Mittel in dickbreiiger Form zu geben. Vielmehr kann man ihm jedwede Kon-sistenz, auch eine halbflüssige oder dünnflüssige, verleihen, ohne daß die Mahlzeit eine stärkere Sedimentierung im Magen zeigt. Dieser Vorteil beruht auf einer außerordentlich feinen Verteilung des Baryumsulfats sowie auf der Wahl des geeigneten Schutzkolloids. Diese feine Verteilung machte es uns möglich, eine Motilitätsprüfung auch bei flüssiger Konsistenz des Röntyums vorzunehmen, da die Austreibungszeit der Kontrastspeise hierdurch nicht beschleunigt wurde. Wir fanden nämlich bei Magen-gesunden mit normaler Azidität nach 1 ½ Stunden noch Rückstände und nach 2–2¼ Stunden den Magen entleert. Dieses

Ergebnis wird nach den Untersuchungen von Kästle, Holzknacht und Haudek mit anderen Kontrastspeisen als normale Entleerungszeit bezeichnet.

Zusammenfassend kann man sagen, daß unsere Versuche mit „Röntyum“ in jeder Weise zufriedenstellend waren.

x) Vergleiche die der Arbeit Simon beigefügten Röntgenphotographien (Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen, Bd. 31, 1923).