Pathologie chirurgicale du sphincter d'Oddi

G.		Chanal
A.		Calame

Genève

L'étude de la pathologie du sphincter d'Oddi, souligne la coexistence de lésions biliaires, pancréatiques et duodénales.

De l'étude anatomique de cette région deux faits ressortent. Ce sont l'indépendance morphologique du sphincter d'Oddi vis-à-vis de la musculature duodénale, et d'autre part, les diverses possibilités d'abouchement du Wirsung et du cholédoque, différences qui conditionnent dans une certaine mesure la pathologie du sphincter. L'étude histologique ne permet pas de conclure dans le sens d'une lésion définie expliquant les différents troubles relevés cliniquement. Les limites de la lésion histologique sont incertaines et ne peuvent être appréciées qu'en prenant en considération les désordres concomitants qui touchent l'appareil biliaire, le pancréas ou le duodénum. L'hyper-tonie primitive du sphincter et la sténose qui en résultent, peuvent avoir un retentissement sur l'appareil biliaire et le pancréas. Ce retentissement peut prendre des aspects variés (cholangite, rétention intra-pancréatique). Une lésion duodénale de voisinage, tel l'ulcère ou une intoxication chronique (alcoolisme) paraissent être deux facteurs qu'il faut prendre en considération dans le déclenchement de la maladie primitive du sphincter. Il faut distinguer d'autre part l'hyper-tonie secondaire, terme qui veut signifier, sans plus, que les désordres ont débuté ailleurs qu'au niveau du sphincter. Cet état peut se rencontrer lorsqu'il existe une lithiase de l'arbre biliaire. Dans l'hyper-tonie secondaire, le retentissement pancréatique est une complication plus rarement rencontrée. En résumé, l'anatomie de la papule joue un rôle certain dans la pathologie du sphincter. L'hypertonie primitive peut avoir de graves repercussions hépatiques, pancréatiques et duodénales. L'hypertonie secondaire accompagne souvent la lithiase biliaire. A tout diagnostic d'hypertonie oddienne vraie, correspond une lésion histologique du sphincter d'Oddi.

* Communication faite à la séance annuelle de la Société Suisse de Gastro-entérologie, St-Gall, 18-19 mai 1957.