Discussion à la suite de la communication du Prof. M. Demole

J.		Jost
M.		Ramseyer

Lausanne

Kyste aérique géant du colon

Une femme de 71 ans, en bonne santé, bien que légèrement diabétique depuis 4 ans, se plaint depuis quelques mois d'un ballonnement abdominal aux changements de positions. Elle a senti une masse sous-ombilicale mobilisable. Légère constipation, parfois faux besoins.

Uexamen clinique confirme la présence de cette masse élastique, arrondie, chan-geant de forme et ne paraissant pas se trouver sous forte tension; elle est mobile. Examens de laboratoires tous normaux; à part une glycémie à 120 mg%. Le toucher recto-vaginal et la rectoscopie (jusqu'à 15 cm) sont normaux.

Lavement baryté: présence d'une diverticulose du bas sigmoïde ralentissant légèrement la progression de la baryte et d'un kyste gazeux ne contenant pas de liquide ou de baryum, ayant une paroi fine, changeant facilement de position et montant, tel un ballon, dans la partie supérieure de l'abdomen au moment où la malade est mise debout. Dans cette situation le haut-sigmoïde et le bas du colon descendant sont repoussés vers le haut. Aucune autre formation kystique, aucun liseré clair doublant la paroi colique ou de déformation festonnée modifiant les haustrations ne sont visibles. Il n'y a pas d'autre sténose que celle provoquée par la diverticulité sigmoïdienne.

Intervention chirurgicale (Dr A. Jost – 10 juin 1961): absence de liquide péritoneal; la masse gazeuse kystique se situe sur le haut sigmoïde. Sa paroi est fine, elle a la grosseur d'un pamplemousse. Le foie est normal, la vésicule contient des calculs -cholécystectomie en passant. Périssigmoïdite diverticulaire typique du sigmoïde inférieur: tout le sigmoïde est réséqué; anastomose termino-terminale. Suites opératoires simples.

Examen anatomique: Sigmoïdite diverticulaire sans kyste aérique. Kyste géant aérique mesurant 8 cm de diamètre, recouvert d'une séreuse non épaissie, ne com-muniquant pas avec l'intestin. La paroi interne du kyste est lisse, formée d'un tissu légèrement fibreux comprenant des amas lympho-leucocytaires et contenant des macrophages et des cellules géantes à corps étrangers. Diagnostic: Diverticulose et diverticulité sigmoïdienne, pneumatose kystique.

Epícrises: La malade n'a plus présenté aucun trouble digestif, elle se porte par-faitement bien, trois ans et demi après l'intervention.

16 Gastroenterologia, Vol. 103, No. 4 (1965)