Akupressur bei Übelkeit und Erbrechen in der Schwangerschaft

K.		Linde
P.		Jüni

Für den 1. Journal Club im Jahr 1995 der FORSCHENDEN KOMPLEMENTÄRMEDIZIN haben wir aktuelle, im vergangenen Jahr publizierte Arbeiten ausgewählt, welche keinen näheren inhaltlichen Zusammenhang aufweisen. Die randomisierte Studie von Belluomini et al. ergänzt dabei das Bild zur Wirksamkeit der Stimulation des Akupunkturpunktes Nei-Koann bei Übelkeit und Erbrechen, welches im 3. Journal Club 1994 (Forsch Komplementärmed 1994;1,3:148-150) vermittelt wurde. Die Arbeit von Kjeldsen-Kragh et al. reanalysiert eine randomisierte kontrollierte Studie zur Prüfung eines vegetarischen Ernährungsregimes bei rheumatoider Arthritis, die wir im 2. Journal Club 1994 präsentiert haben (Forsch Komplementärmed 1994;1,2:101-102). Die Übersicht von Berg und Stüssli liefert kontroverse Aussagen zur Kontroverse der Hausgeburten.

Belluomini J, Litt RC, Lee KA, Katz M: Acupressure for nausea and vomiting of pregnancy: A randomized, blinded study. Obstet Gynecol 1994;84:245-248.

Fragestellung: Vermindert Akupressur die Häufigkeit und Intensität von Übelkeit und Erbrechen während der Schwangerschaft?

Studiendesign: Randomisierte (permutierte Blöcke, sonst keine Angaben), plazebokontrollierte, patientenblinde Studie über 7 Tage (davon 3 Tage Baseline ohne Behandlung).

Rahmenbedingungen: Keine genauen Angaben, vermutlich geburtshilfliche Abteilung einer Universitätsklinik in San Francisco.

Patientinnen: 90 von ihren betreuenden Gynäkologen oder Hebammen zur Studienteilnahme überwiesene Frauen in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft, die an Übelkeit und Erbrechen litten. Ausschlusskriterien waren die Diagnose Hyperemesis gravidarum, andere mit Übelkeit und Erbrechen einhergehende Erkrankungen (einschliesslich ektopische Schwangerschaften etc.) sowie ein aktueller Gebrauch von Antiemetika. Alle überwiesenen Frauen stimmten einer Teilnahme zu und wurden in die Studie aufgenommen. Intervention: Ab dem Morgen des 4. Studientages sollten die teilnehmenden Frauen 4mal täglich für 10 min den Punkt Pe 6 (= Nei-Koann = Punkt 6 des Meridians Kreislauf/Sexualität) oder einen Plazebopunkt (palmare Handfläche proximal des 5. Metakarpalgelenks), an dem kein Meridianpunkt bekannt ist, akupressieren (keine näheren Angaben hierzu). Der zu massierende Punkt und die Akupressur-Technik wurden den Frauen beim Aufnahmegespräch gezeigt. Hauptzielvariablen: Täglich wurde die Häufigkeit und Intensität der Symptomatik mit Hilfe eines Score-Systems (Rhodes-Index) von den Patientinnen bestimmt. Der Rhodes-Index ist ein validiertes Instrument mit Subskalen für Übelkeit (3 Items, max. 12 Punkte), Erbrechen (3 Items, 12 Punkte) und Würgen (2 Items, 8 Punkte); je nach Symptomatik werden zwischen 0 und 32 Punkte vergeben. Die Werte vor (Tage 1-3) und nach Behandlung (Tage 5-7) wurden für jede Patientin gemittelt. Ergebnisse: Die Daten von 60 Frauen (jeweils 30 pro Gruppe) wurden in die

Auswertung aufgenommen. 16 Patientinnen der Verum- und 14 der Kontrollgruppe wurden meist wegen sehr unvollständig ausgefüllter Erhebungsbögen nicht in die Auswertung miteinbezogen. Die Baselinedaten (Schwangerschaft, Alter, Gestationsalter, Symptomatik) beider Gruppen waren vergleichbar. Die Varianzanalyse ergab signifikante Besserungen in beiden Gruppen im Studienverlauf (mittlerer Rhodes-Gesamtindex in der Verumgruppe von 12,64 auf 8,69, in der Placebogruppe von 11,47 auf 10,03). In der Subskala Übelkeit war die Besserung in der Verumgruppe signifikant stärker ausgeprägt als in der Placebogruppe (Scores nach Behandlung Verum: $5,80 \pm 2,9$, Placebo: $7,04 \pm 2,6$; $p = 0,0021$), für das Erbrechen ergaben sich keine signifikanten Unterschiede (Verum: $1,28 \pm 1,9$, Placebo: $1,63 \pm 2,3$). Schlussfolgerung: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Pe 6-Akupressur die Übelkeit in der Schwangerschaft vermindert, nicht aber die Häufigkeit von Erbrechen.

Kommentar – David Jewell, Bristol

Nausea in pregnancy is a good example of a symptom which causes a lot of trouble to pregnant women, but which doctors regard as too minor to merit a lot of research. Specifically, the drug that was known to be reasonably effective was withdrawn from the market some years ago because of doubts of its safety, and it is unlikely that another drug company will be prepared to invest the necessary sums of money in a new drug. Clearly any non-pharmacological means of treating nausea that is based on sound evidence would be very helpful. Does this paper present such evidence? In one word – no. As always when reading papers there are some problems that

© 1995 S. Karger GmbH, Freiburg

genuinely come from study design, and others that seem to be a failure to provide a full report. For instance in this case we are told nothing of how these particular women were recruited, nor do we know the details of how they were randomised or taught the different techniques. As far as recruitment and teaching is concerned, there is a possibility of bias if the recruited women have prior knowledge of, or if the teachers have a particular commitment to acupressure. Table 1 suggests strongly that no bias has been introduced by the method of randomisation. On the positive side, the authors have worked on a short time scale, which is sensible when nausea in pregnancy improves with time.

None of these points are serious enough to destroy the trial. However the results do pose problems. First there is a very high dropout rate (one third). The majority are described as 'lost to follow up', so we cannot tell whether they did not complete the study through the nausea resolving spontaneously or not resolving at all. In either case their absence from analysis may exaggerate the true effect of treatment. In the case of those who were prescribed antiemetics, they should certainly be included as treatment failures, although the numbers here are small. Unfortunately too there is no prior statement as to what will be regarded as treatment failures or successes. The dichotomised data imply that nobody in either group had the vomiting vanish altogether (the figures are presented as those reporting vomiting once and twice a day compared with those reporting it more than twice a day), which is surprising. Worse still, the scores are presented and analysed as if they were normally distributed. However figures such as 1.83 ± 2.7 (the most extreme example in the middle row of table 2) are clearly non-parametric and should be analysed as such, although I do not know if this would make a difference to the analysis. In the end, therefore, this is also a good example of how unhelpful flawed research is. If a pregnant woman with nausea and vomiting comes to see me next week and asks whether acupressure will help her, I don't know any better how to advise her after reading this report than I was before. Which is a pity, considering how much work goes into such studies, the need to know clearly whether acupressure works and women's need to minimise such symptoms safely.

Kontaktadresse: Dr. David Jewell, MA MRCP, Consultant Senior Lecturer in General Practice, Department of Epidemiology and Public Health Medicine, University of Bristol, Canynge Hall, White-ladies Road, UK – Bristol BS8 2PR

Kommentar – Thomas Deininger, Konstanz

In der vorliegenden Arbeit hat man sich dankenswerterweise zum Ziel gesetzt, die Beeinflussbarkeit von Übelkeit und Erbrechen in der Schwangerschaft durch eine funktionelle Therapiemethode (Akupressur) zu objektivieren. Als Reizort der Akupressur wählte man den in der Akupunktur als wirksam beschrieben und in seiner Indikation in bezug auf die Beeinflussung von Übelkeit und Erbrechen oft zitierten Punkt Pe 6 (Nei-Koann).

Hervorzuheben bei dieser randomisierten Studie ist die relativ hohe Probandenzahl von 60 Schwangeren, die ausgewertet werden konnten. Auffällig ist aber, dass ein Drittel aller vorgesehenen Teilnehmerinnen an dieser zeitlich limitierten Studie ihre Mitarbeit abbrachen. Das könnte an dem komplizierten oder den Probandinnen nicht exakt erläuterten Dokumentationssystem gelegen haben.

Bei der Methodenbeschreibung werden Ein- und Ausschlusskriterien genau beschrieben und die demographischen Charakteristika beider Versuchsgruppen dargestellt. Allerdings vermisst man einige Angaben über die Ausführung (Technik) der Akupressur:

Wurde die Akupressur mit einem konstanten Druck über 10 min vorgenommen (was vom Kraftaufwand her sehr schwierig ist) oder mit einem intermittierenden Druck? Diese Aussage wäre interessant, da der Akupressurpunkt im Vergleich zum Placebopunkt wesentlich tiefer lokalisiert ist (zirka 1 cm).

Wie lange und intensiv vor Beginn der Studie wurden die Schwangeren in die Technik der Akupressur eingewiesen?

Wie wurde die exakte Lokalisation von Pe 6 bei jeder Versuchsperson bestimmt (Palpation, Very-point-Technik)?

Wurden die therapeutischen Interventionen pro Tag (außer der morgendlichen Akupressur) zu festen Zeiten vorgenommen oder in Abhängigkeit von der Beschwerdesymptomatik?

Durch eine genaue Beschreibung der Behandlungstechnik könnten eher Rückschlüsse auf eine Reproduzierbarkeit dieser Studie vorgenommen werden.

Unabhängig von dieser Tatsache gestattet die vorliegende Studie eine Aussage über den Effekt einer Akupressurbehandlung an einem spezifischen Akupressurpunkt (Pe 6) im Vergleich zu einem Placebopunkt. Das Ergebnis rechtfertigt den Einsatz einer Akupunktur/Akupressur zur Beeinflussung von Übelkeit während der Schwangerschaft.

Kontaktadresse: Dr. Th. Deininger, Reichenaustr. 5, 78467 Konstanz

Kommentar zur Methodik – Klaus Linde, München

Nach den im Journal Club der Forschenden Komplementärmedizin 1994;1:148-149 besprochenen Arbeiten von Gieron et al. und Yang et al. zur Pe 6-Akupressur bei postoperativem Erbrechen kommt nun die Arbeit von Belluomini et al. bei Schwangerschaftserbrechen zur Diskussion. Was bei den Studien zum postoperativen Erbrechen angesichts der guten Monitorisierungsmöglichkeiten keinerlei Problem darstellte, ist in diesem Fall der kritischste Punkt der Arbeit: Ein Drittel aller randomisierten Patientinnen wurde nicht ausgewertet. Eine derart hohe Abbrecher- bzw. Ausschlussrate ist bei einer so kurzen Studiendauer kaum akzeptabel. Die Gründe für die Ausschlüsse und Abbrüche werden etwas oberflächlich geschildert, scheinen aber in beiden Gruppen vergleichbar zu sein. Leider werden auch eventuelle unerwünschte Ereignisse nicht beschrieben. Die hohe Abbrecher- und Ausschlussrate deutet

auf eine mangelnde Compliance bei den entsprechenden Patientinnen hin, wobei unklar bleibt, ob dies auf die Behandlung oder auf die täglich auszufüllenden Erhebungsskalen zurückzuführen ist.

Insgesamt ist die Berichterstattung in einigen Punkten nicht voll befriedigend. Neben den (wie fast immer) fehlenden Angaben zur Umsetzung der Randomisation sind die Angaben zur Akupressurbehandlung ungenau und die Ergebnispräsentation ist unvollständig. Angesichts des niedrigen Baseline-Scores der Rhodes-Subskala Erbrechen wäre es besonders relevant gewesen zu wissen, wie viele Patientinnen überhaupt erbrachen. Es liegt nahe zu vermuten, dass ein signifikanter Unterschied bei der relativ kleinen Stichprobe kaum zu erwarten war. Lobenswert ist der Hinweis, dass alle 90 überwiesenen Patientinnen auch tatsächlich in die Studie aufgenommen wurden. Leider ist aber nicht klar, wie die Vorselektion durch die überweisenden Ärzte und Hebammen erfolgte. Solche Angaben sind von grosser Bedeutung, damit der Leser beurteilen kann, ob eine stark selektierte oder eine sehr repräsentative Stichprobe überprüft wurde – sie werden aber praktisch nie präsentiert.

Trotz der genannten Kritikpunkte erscheint die Studie geeignet, die bisher vorliegende Evidenz für die Wirksamkeit der Akupressur bei Übelkeit in der Schwangerschaft (siehe [1] zur Übersicht) zumindest in einem eingeschränkten Maß zu erhärten. Ob die genannte Placebobehandlung tatsächlich ohne spezifische Wirkung ist, muss von erfahrenen Akupunkteuren bzw. Akupressuren beurteilt werden.

Literatur

1 Jewell MD: P6 acupressure to treat nausea; in Enkin MW, Keirse MJNC, Renfrew MJ, Neilson JP (eds): Pregnancy and Childbirth Module Cochrane Database of Systematic Reviews: Review no. 06520, 4 May 1993. Published through 'Cochrane Updates on Disk', Oxford: Update Software, 1994, Disk Issue 1.

Kontaktadresse: Dr. Klaus Linde, Projekt «Münchener Modell», Ludwig-Maximilians-Universität, Kaiserstr. 9, 80801 München

Adresse für Sonderdrucke: Michael Katz, MD, Perinatal Service, California Campus, California Pacific Medical Center, P.O. Box 7999, San Francisco, CA 94120, USA

Fasten und vegetarische Diät bei rheumatoider Arthritis? Eine Reanalyse

J. Kjeldsen-Kragh, M. Haugen, O. Førre, et al.: Vegetarian diet for patients with rheumatoid arthritis: Can the clinical effects be explained by the psychological characteristics of the patients? Br J Rheumatol 1994;33:569-575.

Hintergrund: In einer vormals publizierten randomisierten kontrollierten Einfachblindstudie [1] wurde der therapeutische Effekt einer Fastenkur mit anschliessender vegetarischer Eliminationsdiät bei rheumatoider Arthritis (RA) gezeigt [2].

Fragestellung: (1) War in [1] die Patientenselektion verzerrt? (2) Sind die in [1] beobachteten Effekte vor allem auf psychobiologische Faktoren zurückzuführen? (3) Hatte die Umstellung auf vegetarische Diät einen Einfluss auf die psychische Verfassung der Patienten von [1]?

Studiendesign: In [1] wurden n = 27 RA-Patienten zu vegetarischer Diät und n = 26 RA-Patienten zu Normalkost randomisiert. Als Vergleichsgruppe wurde eine Gruppe von 71 konsekutiven RA-Patienten herangezogen. Zwei Ansätze: (1) Querschnittsstudie zur Gegenüberstellung der Patienten von [1] mit denjenigen der Vergleichsgruppe, (2) longitudinale Studie zum prospektiven Vergleich der Verläufe der beiden Gruppen von [1]. Patienten: Randomisierte Studie [1]: n = 53 Patienten mit rheumatoider Arthritis im funktionellen Stadium II oder III, welche mindestens 3 der folgenden Kriterien aufwiesen: mindestens 3 geschwollene

Gelenke, mindestens 6 empfindliche Gelenke, Morgensteifigkeit von mindestens 45 min, BSR mindestens 28 in der ersten Stunde. Vergleichsgruppe: n = 71 un-selektierte, konsekutive RA-Patienten, welche weitgehend in derselben Institution rekrutiert wurden wie die Patienten von [1]; keine zusätzlichen Selektionskriterien. Zielgrößen: Glaube an die Wirksamkeit der Schulmedizin (10 cm VAS), Glaube an die Wirksamkeit der Komplementär-medicin (10 cm VAS). Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLCS) zur Beurteilung des Gesundheits-bewusstseins mit drei Subskalen: (1) Internality – Glaube der Patienten, selbst die Kontrolle über die eigene Gesundheit zu haben; (2) Externality – Glaube, dass andere die Kontrolle über die eigene Gesundheit hätten; (3) Chance Subscale – Glaube, dass der Zufall die Gesundheit und die therapeutischen Erfolge beeinflusse. General Health Questionnaire (GHQ-20) zur Beurteilung der psychischen Belastung mit zwei Subskalen: (1) Depression und (2) Ängstlichkeit.

Alle n = 53 Patienten von [1] füllten zu Studienbeginn den oben beschriebenen Fragebogen aus, bevor ihnen das Resultat der Randomisation bekanntgegeben wurde. Den GHQ-20 füllten sie auch bei allen folgenden klinischen Untersuchungen aus. In der Vergleichsgruppe füllten n = 71 von 79 Patienten, welche darum gebeten wurden, die Fragebogen einmal aus. Resultate der Qwertest mit $p < 0,05$. Baseline-Variablen: Die n = 53 Patienten von [1] unterschieden sich signifikant hinsichtlich folgender Charakteristika von den n = 71 Patienten der Vergleichsgruppe: Die durchschnittliche Krankheitsdauer war kürzer ($p < 0,004$); weniger Patienten benutzten Kortikosteroide bzw. Zytostatika ($p < 0,03$ bzw. $p < 0,00001$); mehr Patienten behaupteten, eine Nahrungsmittelallergie oder -intoleranz zu haben ($p < 0,00001$); sonst gab es keine statistisch signifikanten Baseline-Unterschiede.

Psychologische Variablen

Die Patienten von [1] waren signifikant ängstlicher als diejenigen der Vergleichsgruppe ($p < 0,02$). Sie glaubten signifikant mehr an die Wirksamkeit der Komplementärmedizin ($p < 0,0001$) und