Chiropraktische Manipulation versus «konventionelle» Mobilisation und Manipulation – eine randomisierte kontrollierte Studie

K.		Linde
P.		Jüni

Der diesmalige Journal Club hat sich die Manipulation der Wirbelsäule zum Thema gesetzt. Nachdem wir in der Erstausgabe der FORSCHENDEN KOMPLEMENTÄRMEDIZIN bereits die randomisierte kontrollierte Studie von Koes et al. zu diesem Thema diskutiert haben (Forsch Komplementärmed 1994;1:7), präsentieren wir hier nun (1) eine pragmatische Therapieevaluation in Form einer randomisierten kontrollierten Studie von Meade und Mitarbeitern, die im Jahr 1990 im British Medical Journal breit diskutiert wurde, (2) eine Meta-Analyse von Shekelle et al., welche die bis 1992 vorhandenen Resultate kontrollierter klinischer Studien systematisch und statistisch zusammenfasst, und (3) die randomisierte kontrollierte Untersuchung kinesiologischer Muskeltests von Haas et al.

Meade TW, Dyer S, Browne W, et al: Low back pain of mechanical origin: Randomised comparison of chiropractic and hospital outpatient treatment. BMJ 1990;300: 1431-1437.

Zielsetzung: Vergleich chiropraktischer mit ambulanter Krankenhausbehandlung von lumbalen Rückenschmerzen mechanischer Genese.

Studiendesign: Randomisierte, kontrollierte Studie. Patienten-zuteilung durch Minimisation hinsichtlich ersteinweisender Klinik, Länge des aktuellen Leidens, Anamnese und Stärkegrad der Rückenschmerzen. Follow-up über mindestens 6 Monate, zum Teil bis 12 und 24 Monate.

Rahmenbedingungen: Chiropraktische und Krankenhaus-ambulatorien in elf Zentren.

Patienten: n = 781 Patienten mit Rückenschmerzen zwischen 18 und 65 Jahren wurden in die Studie aufgenommen. Ausschlusskriterien: Verdacht auf radikuläres Schmerzsyndrom, grössere radiologische Veränderungen der Wirbelsäule, Osteopenie, Verdacht auf eine infektiöse Ursache, widrige soziale Umstände. Von den n = 781 Patienten erfüllten n = 24 die Selektionskriterien nicht (13 Krankenhauspatienten und 11 Chiropraktikerpatienten) und n = 16 brachen die Studie zu Beginn ab (8 und 8), so dass 741 Patienten (357 und 384) die Behandlung begannen. Nach 6 Wochen wurden n = 666 Patienten (309 und 357), nach 6 Monaten n = 607 (282 und 325), nach 12 Monaten n = 454 (207 und 247) und nach 24 Monaten n = 194 (90 und 104) nachkontrolliert. n = 60 Patienten brachen die Behandlung ab, n = 77 erschienen nicht zur Nachkontrolle nach 6 Wochen, und n = 29 wechselten das Behandlungszentrum. Interventionen: Behandlung nach freier Wahl der Chiropraktiker, welche primär chiropraktische Manipulationen anwandten, oder nach freier Wahl des Krankenhauspersonals, welches vor allem Mobilisationen oder Manipulationen nach Maitland anwandte.

Hauptzielgrösse: Differenzen der mittleren Veränderungen des Oswestry pain disability questionnaires: Mittelwert der Score-Veränderungen der Krankenhauspatienten minus Mittelwert der Score-Veränderungen der Chiropraktikerpatienten. Der Fragebogen misst zehn verschiedene

Kategorien, z. B. Schmerzstärke, Einschränkungen von Heben, Gehen und Reisen, und reicht von 0% (keine Schmerzen und Einschränkungen) bis 100% (maximaler Schmerz und maximale Einschränkung in allen 10 Kategorien). Eine Verminderung um 2% bedeutet dabei z. B. keine Schmerzen im Vergleich zu wenig Schmerzen oder Fähigkeit, leichte Lasten zu heben, im Vergleich zur Unfähigkeit zu heben; eine Verminderung um 4% bedeutet unter anderem die Fähigkeit, bis zu einer Stunde zu sitzen, im Vergleich zu weniger als 10 Minuten etc. Ergebnisse: Differenzen der mittleren Veränderungen des Oswestry questionnaires: 1,69% [95%-Konfidenzintervall (CI) -0,74-4,12] nach 6 Wochen, 3,31% (CI 0,51-6,11) nach 6 Monaten, 2,09% (CI -1,13-5,31) nach einem Jahr und 7,16% (CI 1,86-12,45) nach 2 Jahren. Schlussfolgerungen: Bei Patienten mit lumbalen Rückenschmerzen, bei denen Manipulation nicht kontraindiziert ist, stellt die chiropraktische Behandlung eine wertvolle Option mit Langzeitnutzen dar. Der Vorteil gegenüber ambulanter Krankenhausbehandlung zeigt sich vor allem bei Patienten mit chronischen und ausgeprägten Rückenschmerzen. Die Einbeziehung chiropraktischer Behandlungen ins nationale Gesundheitssystem Englands sollte in Betracht gezogen werden.

Kommentar – D. Rosier, Luzern

Die Studie von Meade et al. untersucht den klinischen Effekt der chiropraktischen Behandlung gegenüber der «konventionellen» manipulativen bzw. mobilisierenden Behandlung. Als randomisierte, kontrollierte Studie mit Beteiligung von elf

© 1995 S. Karger GmbH, Freiburg

Zentren und Untersuchung von insgesamt 741 Patienten mit einem maximalen Follow-up von 2 Jahren handelt es sich um eine wertvolle Arbeit, die von den Autoren auch kritisch interpretiert wurde. Sinnvollerweise wurden nur Patienten in die Studie eingeschlossen, die keine radikulären Symptome aufwiesen. Eine Diskushernie mit und ohne Nervenwurzelkompression ist eine Kontraindikation für eine chiropraktische Behandlung, da dadurch die Symptomatik noch verstärkt werden kann. Ebenfalls eignen sich schwere, degenerative Wirbelsäulenerkrankungen für eine chiropraktische Behandlung weniger, was wahrscheinlich in Form der «spinal abnormality» als Ausschlusskriterium erfasst wurde.

Von den gemessenen Zielgrößen ist der Winkel des gestreckt angehobenen Beines als objektives Kriterium für die Beurteilung von Rückenschmerzen ungeeignet. Da eine radikuläre Symptomatik ausgeschlossen wurde, ist ein eingeschränktes Messresultat in der Regel durch eine verkürzte ischiocrurale Muskulatur bedingt. Besser eignet sich die Messung der lumbalen Flexion. Sechs Wochen nach Behandlungsbeginn haben sich die klinischen Untersuchungsbefunde in der Chiropraktoren-Gruppe signifikant gegenüber der konventionellen Gruppe verbessert. Bedeutender ist die Aussage, dass sich beim Schmerzmittelgebrauch nach 6 Monaten, einem und 2 Jahren sowie bei den Schmerzangaben nach einem Jahr keine signifikanten Unterschiede ergaben.

Es erstaunt sehr, dass die chiropraktische Behandlung bei Patienten mit chronischen und heftigen Rückenschmerzen vor allem im Langzeitverlauf günstig abschnit. Der Kurvenverlauf (Figur 3 a, b) bei den konventionell behandelten Patienten ähnelt jedoch dem der Chiropraktoren-Gruppe mit einem etwas schlechteren Langzeitergebnis. Man kann deshalb postulieren, dass beide Behandlungsmethoden bei Patienten mit länger dauernden und heftigeren Rückenschmerzen sich auf die Erkrankung günstig auswirken. Gründe für das bessere Abschneiden der Chiropraktoren-Gruppe können in einer besseren Selbsteinschätzung (positive Erwartungen der Patienten, die sich beim Chiropraktor direkt meldeten), im selteneren Vorkommen von depressiven

Verstimmungen, in der kürzeren Wartezeit bis zum Behandlungsbeginn und in der längeren Behandlungsdauer liegen.

Der günstige Spontanverlauf von chronischen Rückenschmerzen ist bekannt. Die Aussagekraft der Untersuchung wäre wesentlich grösser, wenn eine Kontrollgruppe ohne jede Behandlung noch miterfasst worden wäre, um den Behandlungserfolg gegenüber dem Spontanverlauf abschätzen zu können. Da Patienten mit Rückenschmerzen jedoch eine Behandlung erwarten, ist es praktisch unmöglich, eine Kontrollgruppe zu rekrutieren. Sicher haben die chiropraktische Behandlung wie auch konventionelle physiotherapeutische Behandlungsformen als Therapieprinzip bei mechanischen Rückenbeschwerden einen Platz. Die Indikation muss jedoch sorgfältig gestellt werden. Ein Nachteil der Behandlung liegt in der Abhängigkeit des Patienten vom jeweiligen Therapeuten. Therapien, die den Patienten zur Selbstmobilisation motivieren und ihm

Eigenverantwortung übertragen, sollte der Vorzug gegeben werden.

Kontaktadresse: Dr. Daniela Rosier, Oberärztin, Abteilung Rheumatologie, Medizinische Klinik, Kantonsspital Luzern, CH-6000 Luzern 16

Kommentar – E. Faigaux, Bern

Die Studie von Meade und Mitarbeitern belegt, unseres Wissens erstmals in Europa, was verschiedene Untersuchungen in den USA und in Kanada seit Jahren immer wieder gezeigt haben: nämlich, dass für ein gleiches Beschwerdebild die chiropraktische Behandlung meist sowohl medizinisch wie auch volkswirtschaftlich deutlich weniger kostet als andere Therapieformen. Die angesprochenen Studien in Übersee gehen auf Untersuchungen von Versicherungen zurück, die über Statistiken verfügen, welche sowohl die effektiven Behandlungskosten als auch die durch Arbeitsunterbrüche verursachten Kosten erfassen. Im Gegensatz zur vorliegenden Arbeit haben diese Statistiken nicht nur physiotherapeutische, sondern auch medikamentöse und sogar chirurgische Behandlungen mit der chiropraktischen verglichen, wobei die letztere gesamtkostenmässig fast immer deutlich besser abschnitt. Dies trifft, nach unseren Berechnungen, auch in der Schweiz zu. Wir werden nicht selten auch von Patienten darauf angesprochen, wie kostengünstig wir im Gegensatz zu anderen Anbietern eigentlich arbeiten.

Kontaktadresse: Dr. Eric Faigaux, Chiropraktor, Sulgenauweg 38, CH-3007 Bern

Kommentar zur Methodik – C. Fux und P. Jiini, Olten

Der pragmatische Vergleich zweier verschiedener Therapiekonzepte von Meade et al. ergibt einige methodologische Probleme, da weder Therapeuten noch Patienten verblindbar sind und somit nie ganz klar werden kann, worauf der Erfolg eines Konzeptes letztlich beruht: auf der Intervention, dem Umfeld oder der Erwartungshaltung von Therapeut oder Patient.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang etwa die Feststellung, dass 80% der ursprünglichen Krankenhauspatienten, jedoch nur 28% der ursprünglich einen Chiropraktor konsultierenden Patienten sich dazu bereit erklärten, die Therapiewahl dem Zufall zu überlassen (Randomisation). Dies kann auf eine grössere Erwartungshaltung der initial den Chiropraktor konsultierenden Patienten hinweisen. Diese These wird unterstützt durch die Beobachtung, dass die chiropraktische Behandlung bei diesen Patienten z.B. nach 6 Monaten einen statistisch hochsignifikanten Vorteil von 6,75% gegenüber der ambulanten Krankenhausbehandlung aufwies, während bei den Patienten, welche ursprünglich das Krankenhaus konsultierten, mit -0,32% tendenziell sogar die Krankenhausbehandlung im Vorteil war.

Aufgrund einer von den 11 beteiligten Zentren durchgeführten Patientenevaluation entschied die Studienleitung über die Aufnahme der Patienten und förderte so eine bei Multizenter-

Studien oft schwierig zu erreichende «Unité de doctrine» der Patientenrekrutierung. Die Autoren lassen den Leser dieses Prozedere mustergültig nachvollziehen: einerseits durch eine tabellarische Aufstellung der untersuchten Patienten zweier Zentren zur Nichterfüllung der Selektionskriterien und Verweigerung der Studienteilnahme, andererseits durch einen Algorithmus des Studienablaufs.

Dann erfolgte die Randomisation, über deren Art wir leider nichts erfahren. Die Vergleichbarkeit beider Gruppen wurde durch Minimisation gesichert (Optimierung der Vergleichbarkeit durch Zuordnung der Patienten nach Massgabe der prognostisch wichtigen Faktoren). Da die Minimisation häufig direkt durch den aufnehmenden Arzt durchgeführt wird und keine Angaben zur Verblindung der Randomisation zu finden sind, ist eine systematische Verzerrung durch unterschiedliche Patientenselektion nicht ganz auszuschliessen (Selektionsbias). Die Gruppenvergleichbarkeit wird für die 741 Patienten, welche zumindest 6 Monate in der Studie waren, gut belegt. Eine entsprechende Dokumentation z. B. für die 194 Patienten, die 2 Jahre lang nachkontrolliert wurden, wäre hilfreich. Insgesamt 781 Patienten wurden randomisiert. Obwohl die Autoren angeben, nach dem Intention-to-treat-Prinzip zu analysieren, werden nur maximal 741 Patienten in die Berechnungen eingeschlossen. Dies mag legitim sein für die 24 Patienten, welche die Selektionskriterien nicht erfüllten, jedoch nicht für die 16 Patienten, welche die Randomisation durchliefen, die Studie dann aber frühzeitig abbrachen. Wurde das Prinzip des Intention-to-treat im weiteren Verlauf der Studie dann konsequent befolgt? Es ist aus der Publikation nicht ersichtlich, wie viele Patienten tatsächlich in die Analysen gingen, vielmehr ergeben die Tabellen 3-6 dazu ein inkonsistentes Bild. Zudem fehlt eine Beschreibung der Studienabbrecher nach Gruppenzugehörigkeit und Grund des Abbruchs. Somit kann nicht beurteilt werden, ob die Resultate durch die Nichterfassung der Abbrecher verzerrt sein könnten.

Obwohl mit der Differenz der mittleren Veränderung des Oswestry-Scores eine Hauptzielvariable definiert wurde, ist nicht eindeutig, wie die Resultate zu interpretieren sind. Sind, um definitive Schlussfolgerungen zu ziehen, nun die Resultate aller Patienten nach 6 Monaten massgebend? Oder sollen die Zahlen der 194 Patienten, welche nach 2 Jahren nachkontrolliert wurden, dazu herangezogen werden? Wurden z. B. die Ergebnisse der 454 Patienten der 1-Jahres-Nachkontrolle berücksichtigt, so ergäben sich keinerlei statistisch signifikante Unterschiede. Die globale Wahrscheinlichkeit α , dass ein inferenzstatistischer Test rein zufällig auf dem individuellen 5%-Niveau signifikant ausfällt, beträgt 1-0,95 – eben 5%. Werden zwei statistisch voneinander unabhängige Tests gemacht, so beträgt die globale Wahrscheinlichkeit α $1-(0,95)^2$ – schon 9,75%. Bei n Tests entsprechend $1-(0,95)^n$. So überrascht es nicht, wenn bei zwanzig Tests einer rein zufällig signifikant ausfällt. Diesem Umstand sollte Rechnung getragen werden – vorzugsweise im Design durch eindeutige Festlegung eines Endpunktes, sonst bei der Analyse durch Korrektur des individuellen α . Dazu wird meistens die konservative Bonferroni-Korrektur verwendet: Dividieren des individuellen α durch die Anzahl Tests. Wird dies für die vier Tests der Inferenzanalyse der gesamten Population gemacht (erste Zeile von Tabelle 5), so ergibt sich ein neues individuelles Signifikanzniveau α^* von 0,0125 oder 1,25%, welches unterschritten werden muss, damit die globale α -Fehlerwahrscheinlichkeit nur 5% beträgt. Auch nach dieser Korrektur kann die Differenz von 7,16% nach 2 Jahren als statistisch signifikant akzeptiert werden. Für den Kliniker mag die Hauptzielvariable, der Oswestry-Score, unanschaulich sein. Die Autoren vermitteln deshalb in einer tabellarischen Übersicht in vorbildlicher Weise den Bezug zur Praxis: Sie

zeigen, dass z.B. bereits eine Differenz von 2% klinisch relevanten Unterschieden entsprechen kann und somit auch das Entdecken eines statistisch signifikanten Unterschieds von wenigen Prozentpunkten sinnvoll ist. Dies fand auch Eingang in die Auswertung der planerisch mustergültigen Pilot-studie als Grundlage der Fallzahlkalkulationen.. So wurde etwa vor Studienbeginn errechnet, dass 2000 Patienten notwendig seien, um eine Differenz von 2% mit einer Wahrscheinlichkeit (Power) von 90% auf dem 5%-Niveau zu entdecken.

Kontaktadresse: Dr. Ch. Fu, Arbeitsgruppe für klinische Epidemiologie, Postfach, CH-4600 Olten

Adresse für Sonderdrucke: Dr. T.W. Meade, MRC Epidemiology and Medical Care Unit, Northwick Park Hospital, Harrow, Middlesex HA13UJ, England

Manipulation bei lumbalen Rückenschmerzen – eine Meta-Analyse

Shekelle PG, Adams AH, Chassin MR, et al:

Spinal manipulation for low-back pain. Ann Intern Med 1992;117:590-598.

Zielsetzung: Übersicht zu Anwendung, Komplikationen und Wirksamkeit spinaler Manipulation bei lumbalen Rückenschmerzen.

Datenquellen: Medline-Suche mit den MeSH-Begriffen CHIROPRACTIC, MANIPULATION und BACKACHE, Überprüfung der Literaturlisten, Kontaktierung von Experten.

Studienselektion: Alle Studien zu Verwendung und Komplikationen und alle kontrollierten klinischen Studien zur Wirksamkeit spinaler Manipulation. 58 Artikel, davon 25 kontrollierte klinische Studien, konnten gefunden werden.

Datenauswertung: Daten zu Verwendung und Komplikationen der spinalen Manipulation wurden zusammengefasst, kontrollierte Studien wurden auf ihre Qualität hin geprüft. Zur Schätzung der Schmerzreduktion und der Verbesserung funktio-neller Aspekte wurden 9 Studien mit der Confidence Profile Method meta-analytisch zusammengefasst. Ergebnisse: Der Grossteil der Manipulationen in den USA wird von Chiropraktoren gemacht. Ernsthafte Komplikationen wie