Gesunde Ernährung statt Vitaminpillen nach dem Infarkt?

P.

Jüni

Olten

med. pract. P. Jüni, Arbeitsgruppe für klinische Epidemiologie (AKE), Postfach, CH-4601 Olten (Schweiz)

Der positive Einfluss einer gesunden Ernährung auf kardio-vaskuläre Erkrankungen gewinnt zunehmende Beachtung -auch jenseits cholesterinarmer Diät. Diskutiert wird insbesondere die günstige Wirkung von antioxidativen Vitaminen [10], Flavonoiden [9] und Fischölen [6]. So fördert denn auch eine MEDLINE-Suche mit den Begriffen acid*, antioxi*, bio-flavonoid*, caroten*, diet*, fiber*, fibre*, fish*, flavonoid*, fruit*, oil*, supplement*, vitamin* in Titel oder MeSH, verbunden mit cardio*, cardia*, atheroscler*, arterioscler*, heart*, myo-card*, coronar*, angina* in Titel oder MeSH und randomized controlled trial als Publikationstyp alleine für das laufende Jahr insgesamt 13 randomisierte kontrollierte Studien zutage, welche den Einfluss von Nahrungsbestandteilen auf kardio-vaskuläre Morbidität oder Mortalität prüfen, 5 davon publiziert in führenden internmedizinischen Zeitschriften [7, 8, 14, 15, 18]. Interessanterweise bemüht sich jede dieser Studien darum, den Einfluss isolierter, standardisierter Nahrungsbestandteile auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu testen. Die Resultate fielen unterschiedlich aus, z. B. zeigten sich ein statistisch gesicherter, jedoch fraglich relevanter Effekt von Vitamin E [18] und der fehlende Vorteil eines erhöhten Konsums von β -Carotin [8].

Der Ansatz zur Verabreichung isolierter Substanzen scheint reduktionistisch. Die Idee dazu stammt grösstenteils aus Kohortenstudien zur Verminderung von Krebs- oder Herzinfarktrisiko z.B. durch den Konsum von Früchten oder Gemüse [13]. Aufgrund von pathophysiologischen Überlegungen und epidemiologischen Daten wird die vermutlich gesundheits-fördernde Wirkung dieser Nahrungsmittel auf einige wenige Substanzen zurückgeführt, der Effekt dieser Substanzen in sogenannten explanatorischen Interventionsstudien geprüft. Den explanatorischen Studien sind praxisnähere pragmatische Studien gegenüberzustellen, welche Gesamtkonzepte in möglichst alltäglichem klinischem Umfeld untersuchen [11]. Im vorliegenden Fall:

Ernährungskonzept statt Ernährungsbestandteil. Drei randomisierte kontrollierte Studien weisen darauf hin, dass derartige, pragmatische Ansätze für die Diätetik erfolgversprechend sein mögen.

Burr et al. publizierten 1989 eine randomisierte kontrollierte Studie mit faktoriellem Design bei 2033 Männern mit Status nach Myokardinfarkt zum Einfluss dreier diätetischer Interventionen auf die Mortalität [1]: (a) fettarm, aber reich an ungesättigten Fettsäuren, (b) faserreiche oder (c) fischreiche Ernährung. Während sich bei den Patienten mit fettarmer oder faserreicher Diät kein Effekt abzeichnete, zeigten die-jenigen unter fischreicher Ernährung eine signifikante Reduktion der Gesamtmortalität von 12,8% auf 9,3% (Odds Ratio (OR) 0,70; 95%-Konfidenzintervall (CI) 0,53-0,93).

In einer randomisierten kontrollierten Studie von Singh et al. wurden 406 konsekutive Patienten mit Status nach kurzlichem Myokardinfarkt oder instabiler Angina pectoris randomisiert einer

cholesterinarmen Diät oder einer Ernährung mit vermehrtem Konsum von Früchten, Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen und Fisch zugeteilt [17]. Letztere führte zu einer signifikanten Verminderung der Gesamtmortalität auf 21 gegenüber 38 Todesfällen (OR 0,50; CI 0,28-0,88). Schliesslich zeigte die randomisierte Studie von de Lorgeril et al. bei 605 Patienten mit Status nach Myokardinfarkt eine signifikante Verminderung der Gesamtmortalität durch den vermehrten Genuss von Brot, Gemüse, Fisch, Geflügel und Früchten und den verminderten Konsum von Fleisch, Butter und Rahm von 8 versus 20 Todesfälle (OR 0,39; CI 0,17-0,89) [3]. Die Patientenzahlen der drei zitierten Studien sind relativ klein, dementsprechend gross sind Konfidenzintervalle und Unsicherheit. Werden die beiden Studien von Singh und de Lorgeril – trotz an anderer Stelle zu diskutierenden Vorbehalten – im Hinblick auf das vergleichbare Patientengut und die hinreichend ähnlichen Interventionen gepoolt, so ergibt sich eine OR von 0,46 mit dem bereits beträchtlich engeren Konfidenzintervall von 0,28 bis 0,73 (Mantel-Haenszel). Ist dieses Resultat klinisch relevant?

In einer kumulativen Meta-Analyse untersuchten Lau et al. 1992 die Wirkung von 15 Massnahmen zu Behandlung und Prävention des akuten Myokardinfarktes [12]. Die Mortalitätsverminderung als OR versus Placebo betrug bei heute

KAIUIER

© 1996 S. Karger GmbH, Freiburg Fax (07 61) 4 52 0714

etablierten Behandlungen des Myokardinfarktes für Aspirin 0,77 (CI 0,70-0,84), β -Blocker 0,88 (CI 0,80-0,98) und Thrombo-lytika 0,75 (CI 0,71-0,79), bei sekundären Präventionsmassnahmen für Aspirin 0,90 (CI 0,82-1,00), für β -Blocker 0,81 (CI 0,73-0,89).

Im Vergleich zu diesen Ergebnissen mutet eine Verminderung der Gesamtsterblichkeit entsprechend einer OR von 0,46 sogar unglaublich relevant an. Sicher ist zumindest deren Ausmass mit Vorsicht zu geniessen: Erstens wurden die drei referierten Studien nicht aufgrund einer systematischen Literatursuche identifiziert, deren Zitation könnte deshalb ein verzerrtes Bild der Realität liefern: Citation Bias [16]. Zweitens könnte der Publication Bias – selbst wenn die vorliegenden Studien alle publizierten Arbeiten zum Thema darstellen würden – zur Überschätzung des Effektes führen: kleine positive Studien haben die grössere Wahrscheinlichkeit publiziert

zu werden als negative [4, 5]. Drittens unterlagen vor allem die Patienten der Studien von Singh und de Lorgeril einem sehr hohen Mortalitätsrisiko, dies könnte zu einer Überschätzung des Effektes bei Patienten mit geringerem Risiko führen, wie von Davey Smith für die Cholesterinsenkung gezeigt [2]. Fazit: Trotz fehlender definitiver Schlussfolgerungen dürften die diskutierten Resultate – mit Blick auf die geringe Wahrscheinlichkeit relevanter Nebenwirkungen einer vor allem im Mittelmeerraum von breiten Bevölkerungsschichten genossenen Ernährung – Klinikern und Patienten als Basis für vernünftige Ernährungsumstellungen nach Diagnose einer koronaren Herzkrankheit dienen. Wissenschaftler sollten zur Durchführung systematischer Übersichtsarbeiten und grossangelegter randomisierter kontrollierter Studien zu kardioprotektiver Ernährung veranlasst werden – fernab von Vitaminpillen.

Literatur

Burr ML, Fehily AM, Gilbert JF, et al: Effects of changes in fat, fish, and fibre intakes on death and myocardial reinfarction: Diet and reinfarction trial (DART). Lancet 1989;2:757-761.

Davey Smith G, Song F, Sheldon TA: Cholesterol lowering and mortality: The importance of considering initial level of risk. BMJ 1993;306:1367-1373.

de Lorgeril M. Renaud S, Mamelle N, et al: Mediterranean alpha-linolenic acid-rich diet in secondary prevention of coronary heart disease. *Lancet* 1994; 343:1454-1459.

Dickersin K, Min YI: NIH clinical trials and publication bias. *Online J Curr Clin Trials* 1993;Doc No 50.

Egger M. Davey Smith G: Misleading meta-analysis. *BMJ* 1995;310:752-754.

Gapinski JR VanRuiswyk JV. Heudeberl GR. Schechtman GS: Preventing restenosis with fish oils following coronary angioplasty. A meta-analysis. *Arch Intern Med* 1993;153:1595-1601.

Greenberg ER. Baron JA. Karagas MR, et al: Mortality associated with low plasma concentration of beta carotene and the effect of oral supplementation. *JAMA* 1996;275:699-703.

Hennekens CH. Buring JE. Manson JE, et al: Lack of effect of long-term supplementation with beta carotene on the incidence of malignant neoplasms and cardiovascular disease. *N Engl J Med* 1996;334: 1145-1149.

Hertog MGL: Antioxidative Flavonoide in der Nah-rung: Herzinfarkt- und Karzinomrisiken. *Forsch Komplementärmed* 1995;2:283-288.

Jha P, Flather M. Lonn E, et al: The antioxidant vitamins and cardiovascular disease. A critical review of epidemiologic and clinical trial data. *Ann Intern Med* 1995;123:860-872.

Jüni P: Randomisierte kontrollierte Studien in der Komplementärmedizin. *Forsch Komplementärmed* 1994;1:166-176.

Lau J. Antman EM, Jimenez-Silva J. et al: Cumulative meta-analysis of therapeutic trials for myocardial infarction. *N Engl J Med* 1992;327:248-254.

Moser U: Antioxidative Vitamine. *Forsch Komplementärmed* 1995;2:278-282.

Omenn GS, Goodman GE, Thornquist MD, et al: Effects of a combination of beta carotene and vitamin A on lung cancer and cardiovascular disease. *N Engl J Med* 1996;334:1150-1155.

Rapola JM, Virtamo J, Haukka JK, et al: Effect of vitamin E and beta carotene on the incidence of angina pectoris. A randomized, double-blind, controlled trial. *JAMA* 1996;275:693-698.

Ravnskov U: Cholesterol lowering trials in coronary heart disease: Frequency of citation and outcome. *BMJ* 1992;305:15-19.

Singh RB. Rastogi SS, Verma R, et al: Randomised controlled trial of cardioprotective diet in patients with recent acute myocardial infarction: Results of one year follow-up. *BMJ* 1992;304:1015-1019.

Stephens NG, Parsons A, Schofield PM, et al: Randomised controlled trial of vitamin E in patients with coronary disease: Cambridge Heart Antioxidant Study (CHAOS). *Lancet* 1996;347:781-786.

Editorial

Forsch Komplementärmed 1996;3:216-217

217