Editorial

K.P.

Hellriegel

II. Innere Klinik, Krankenhaus Moabit, Berlin

Akute Leukämien

Sitzung »Aktueller Stand von Therapiestudien«, Innsbruck 1982

Bei der Jahrestagung der Österreichischen und Deutschen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie in Innsbruck im Oktober 1982 fand erstmals eine Sitzung »Aktueller Stand von Therapiestudien« statt. Mit der Einführung dieser Sitzung soll den Kongreßteilnehmern die Möglichkeit gegeben werden, neueste Untersuchungsergebnisse von laufenden Therapiestudien aus den Gebieten der Hämatologie und Onkologie vorzutragen. Eine ähnliche Sitzung, die »Aktuellen Mitteilungen«, war in den vergangenen Jahren bei den Jahrestagungen der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie auf großes Interesse gestoßen und soll fortgesetzt werden. Bei den »Aktuellen Mitteilungen«, die in der Zeitschrift »Blut« publiziert werden, wird der inhaltliche Schwerpunkt künftig auf den Gebieten der experimentellen Hämatologie und Onkologie liegen.

Die bei der Sitzung »Aktueller Stand von Therapiestudien« gehaltenen Vorträge werden in diesem Heft veröffentlicht. Die Mehrzahl dieser Beiträge befaßt sich mit dem Thema »Akute Leukämien«.

Die akuten Leukämien gehören zu den bösartigen Erkrankungen, bei denen innerhalb der letzten 10 Jahre die größten Fortschritte auf dem therapeutischen Sektor erzielt werden konnten. Die bei der zytostatischen Therapie der akuten Leukämien wie auch der malignen Lymphome gesammelten Erfahrungen haben die Chemotherapie der bösartigen Geschwülste bereichert und die Forschung auf diesem Gebiet stimuliert.

Der Fortschritt in der Therapie akuter Leukämien konnte durch die Kombination von Zytostatika, eine Intensivierung der Induktions-Chemotherapie und durch eine Verbesserung der supportiven Therapie erzielt werden. Rezidivfreie Überlebenszeiten von 5 und mehr Jahren bei etwa 70 % der Kinder mit akuter Lymphoblastenleukämie und Vollremissionsraten von 70-80 % bei akuten Leukämien im Erwachsenenalter sind bereichernder Ausdruck des erzielten Fortschrittes. Etwa 10-15% der Erwachsenen mit akuter nicht-lymphoblastischer Leukämie können heute mit einer mehr als 5 Jahre anhaltenden Remission rechnen. Aufgrund unserer heutigen Kenntnisse ist nach fünfjähriger ununterbrochener Remissionsdauer die Rezidivwahrscheinlichkeit nur noch sehr gering, so daß bei diesen Langzeitüberlebenden von einer Heilung gesprochen werden kann. Der Anteil der Langzeitüberlebenden konnte in den letzten 10 Jahren nicht wesentlich erhöht werden, da die Mehrzahl der Patienten nach mehrwöchiger bis mehrmonatiger Remission ein Rezidiv erleidet.

In den letzten Jahren hat sich deshalb das Therapieziel gewandelt. Während vor einem Dezenium die Bemühungen dahin gingen, eine möglichst hohe Remissionsrate zu erzielen, steht zur Zeit im Vordergrund, bei zumindest gleich hoher Remissionsrate die Remissionsdauer zu verlängern und damit die Heilungsrate zu erhöhen. Gegenwärtige Therapiekonzepte basieren auf

einer Intensivierung der Remissions-Induktions-behandlung und/oder auf einer intensiveren Behandlung während der Remission zur Rezidiv-Verhütung. Zur Remissions-verlängerung finden gegenwärtig folgende Therapieverfahren Anwendung: Die Zytostatika-Dauertherapie, die Konsolidierungs-Behandlung (Verwendung der gleichen Zytostatika wie bei der Remissions-Induktionsbehandlung), die Früh- oder die Spät-Intensifikation (Einsatz anderer Zytostatika als bei der Remissions-Induktion), die Immuntherapie und die Knochen-mark-Transplantation (allogen, isogen oder autolog). Keines dieser Therapieverfahren – mit Ausnahme der isogenen Knochenmark-Transplantation – ist allerdings bisher imstande, den Prozentsatz der Langzeitüberlebenden entscheidend zu verbessern. Die Suche nach effektiveren und selektiveren Therapieformen wird daher auch in Zukunft eine der wesentlichen Forschungsaufgaben sein.

Die gegenwärtigen intensiven Bemühungen um die Verbesserung der Prognose Leukämie-Kranker spiegeln sich auch in den folgenden Beiträgen wider. Herausgeber und Schriftleitung der Zeitschrift »Onkologie« haben sich dankenswerterweise bereit erklärt, diese in der Sitzung »Aktueller Stand von Therapiestudien« gehaltenen Vorträge zu publizieren.

Prof. Dr. K. P. Hellriegel, II. Innere Klinik, Krankenhaus Moabit, Turmstraße 21, D-1000 Berlin
21