Hochdosiertes Cytosinarabinosid

Eine Zusammenfassung

S.

Seeber

Zentrum f. Innere Medizin, Med. Klinik III (Onkologie, Hämatologie, Immunologie),
Städt. Klinikum Leverkusen

Sonderdruckbestellungen an: Prof. Dr. S. Seeber, Zentrum für Innere Medizin, Med. Klinik III (Onkologie, Hämatologie, Immunologie), Städt. Klinikum Leverkusen, Döhnnberg 60, D-5090 Leverkusen

Die Behandlung mit Cytarabin in hoher Dosierung stellt eine gute Möglichkeit dar, refraktäre hämatologische und lymphatische Systemerkrankungen wirksam zu behandeln. Möglicherweise kann der Einsatz von hochdosiertem Ara-C in modernen Induktionsprotokollen für Leukämien zu einer höheren Rate anhaltender kompletter Remissionen führen. Aus den bisher publizierten Daten und aus den Berichten des Ulmer Symposiums geht hervor, daß als gesicherte Indikationen zunächst therapierefraktäre akute myeloische Leukämien anzusehen sind. Nach dem Bericht von Preisler et al. (1983) konnte bei etwa 30% von 165 Patienten mit ANLL mit der hochdosierten Cytarabin-Behandlung eine Vollremission erzielt werden. Ähnliche Daten konnten von Rohatiner et al. (1983), von Willemze et al. (1983) und von Estey et al. (1983) erhoben werden. Die hohe Cytarabin-Dosierung kann bei geeigneten Patienten auch durch ein Anthracyclin ergänzt werden [Herzig et al., 1983].

Neben den akuten myeloischen Leukosen zählen akute lymphatische Leukämien und akute undifferenzierte Leukämien ebenfalls zu den Erkrankungen, die bei mangelhaftem Ansprechen gegenüber konventionellen Chemotherapie-Kombinationen noch in Vollremission gebracht werden können [Estey et al., 1983; Rohatiner et al., 1983]. Darüber hinaus sind Vollremissionen auch bei der CML-Blastenkrise unter hochdosiertem Ara-C beschrieben worden [Capizzi et al., 1983]. Das Prinzip der hochdosierten Ara-C-Therapie ist bei verschiedenen Non-Hodgkin-Lymphomen ebenfalls wirksam, weniger allerdings beim refraktären Myelom [Barlogie et al., 1983].

Die im Rahmen des jetzigen Symposiums vorgetragenen Ergebnisse deutscher Zentren bestätigen, wenn auch mit teilweise kleinen Fallzahlen, in ihrer Tendenz diese klinischen Ergebnisse. Darüber hinaus konnten nun auch günstige Ergebnisse bei der intravenösen Therapie der Meningiosis leucaemica mit hochdosiertem Ara-C berichtet werden. Berücksichtigt man die Pharmakodynamik der zellulären Resistenz gegenüber konventionell dosiertem Cytarabin, so sind hier vor allem vier Resistenz-induzierende Faktoren zu nennen: verminderte Aktivierung über Kinasen, vermehrte Inaktivierung über Desaminasen, verminderte Inkorporation, verminderte Ara-CTP-Retention. Alle diese Faktoren können durch ein hohes externes Cytarabin-Angebot in ihrer Wirksamkeit reduziert werden, so daß eine pharmakodynamisch gute Begründung für das Konzept der hohen Ara-C-Medikation vorliegt.

Unter dem Eindruck der bisher vorliegenden klinischen Studien und der jetzigen aktuellen Berichte deutscher Zentren wurde in der Diskussion zunächst die Frage nach der optimalen Dosierung der sogenannten »high dose«-Cytarabin-Behandlung aufgeworfen. Es konnte Übereinstimmung darüber

erzielt werden, daß nicht zuletzt aus pharmakologischen Gründen eine Dosierung von 3 g/m² Cytarabin alle 12 Stunden, jeweils als etwa 1-stündige Infusion gegeben, die nach derzeitigem Wissen anzustrebende Richtdosierung darstellt. Die Dauer dieser Behandlung (3 bis maximal 6 Tage entsprechend 36 bis maximal 72 g pro Therapiekurs) richtet sich einmal nach den Risikofaktoren des Patienten (z. B. Allgemeinzustand, hohe Ausgangszellzahl), wobei im Sinne einer Risikoadaptation bei prognostisch ungünstigen Krankheitsverläufen nur 3 bis 4 Tage dosiert werden sollte. Zum anderen hängt die Gesamtdosis davon ab, ob die hochdosierte Cytarabin-Behandlung mit einem Anthracyclin kombiniert wird. Auch in diesem Falle ist eine etwa 30%ige Dosisreduktion, am besten durch eine Verkürzung der Gesamttherapiezeit, angebracht. Darüber hinaus stimmte das Auditorium zu, daß die Entscheidung über die zeitliche Dauer und damit die Gesamtdosis eines Kurses durch den behandelnden Arzt – von der klinischen Situation abhängig – flexibel gehandhabt werden sollte, um vermeidbare Risiken zu umgehen. Es wurde dann die Frage diskutiert, bei welchen Patienten die Hochdosisbehandlung mit Cytarabin relativ frühzeitig in der Induktion erfolgen konnte. Auch bei dieser wichtigen Problematik konnte eine weitgehende Übereinstimmung erzielt werden: Patienten, bei denen der erste Induktionskurs mit dem konventionellen TAD-Programm nur ein unbefriedigendes Ergebnis bringt, haben in der Regel eine schlechte Chance, eine Vollremission zu erreichen. Damit entfällt für diese Patienten auch die Chance einer Transplantation, so daß in solchen Fällen, auch unter Inkaufnahme eines höheren iatrogenen Risikos, ein frühzeitiger Einsatz der hochdosierten Ara-C-Medikation gut begründbar wäre.

Wenn durch die hochdosierte Cytarabin-Behandlung, trotz einer klinisch meist sehr ungünstigen Ausgangssituation, eine komplette Remission induziert werden kann und eine Transplantation nicht in Frage kommt, ist die zu erwartende Remissionsdauer häufig auf einen kurzen Zeitraum beschränkt. Da während einer solchen sekundären Remission jedoch die therapeutisch wichtige hämatologische Ausgangssituation weit günstiger geworden ist, muß überlegt werden, inwieweit das Ergebnis einer hochdosierten Cytarabin-Behandlung chemotherapeutisch konsolidiert werden sollte. Nach den Erfahrungen verschiedener auch inländischer Gruppen hat sich gezeigt, daß sich hierbei ein weiterer Kurs mit hochdosiertem Cytarabin eignet, zumal dieser dann meist besser verträglich ist und zu einer nur kurzfristigen Aplasie führt. Es erscheint allerdings sinnvoll, bei einer solchen konsolidierenden Maßnahme das iatrogene Risiko wiederum durch eine Dosisreduktion (z. B. 36 bis 42 g Ara-C als Gesamtdosis) zu vermindern. Die Diskussion befaßte sich schließlich mit dem Toxizitätsproblem, welches ja die eigentliche Begrenzung für die klinische

58

Seeber: Hochdosiertes Cytosinarabinosid

Anwendung des hochdosierten Cytarabins darstellt. Es wurde nochmals festgestellt, daß sowohl die hämatologische Toxizität als auch die nicht hämatologische Toxizität (zerebellare Störungen, Keratitis und Konjunktivitis, Erythem, Erbrechen und Diarrhoeen) unter einer offenbar kritischen Grenzdosis von 48 g/m²/Zyklus reversibel sind. Unter Berücksichtigung der sehr ungünstigen Prognose der Patienten des Indikationsbereichs für die hochdosierte Cytarabin-Behandlung scheint die Toxizität daher akzeptabel zu sein. Von großem klinischem Interesse war die Diskussion über die Möglichkeiten zur Reduktion der nicht hämatologischen Toxizität. Die Komplikationen der Behandlung im ophthalmologischen Bereich können durch regelmäßige Augenspülungen, die offenbar einen Verdünnungseffekt bewirken, auch durch regelmäßige Applikation geeigneter Augentropfen (Visa-dron® (Basotherm), Vidisept®

(Mann)) weitgehend kupert werden. Wegen der zu erwartenden Diarrhoen ist ein hohes parenterales Flüssigkeitsangebot angezeigt: Die Verträglichkeit ist nach eigener Erfahrung dann deutlich besser. Zusammenfassend konnte festgestellt werden, daß die Behandlung mit hochdosiertem Cytarabin bei refraktären Leukosen prinzipiell wirksam ist und zu teilweise beachtlichen Remissionsraten geführt hat. Im Einzelfalle konnte hierdurch sogar die Möglichkeit zu einer Knochenmarkstransplantation eröffnet werden. Darüber hinaus ist die Behandlung auch bei Meningiosis leucaemica effektiv. Die Toxizität dieser Behandlungsmodalität muß in Anbetracht der infausten Situation der in Frage kommenden Patienten als akzeptabel eingestuft werden, vergleichbar mit der ebenfalls als akzeptabel eingestufteten, sicher deutlich höheren Toxizität einer Knochenmarkstransplantation. Die hochdosierte Cytarabin-Behandlung ist im Rahmen der Primärbehandlung akuter Leukosen noch nicht genügend untersucht. In einer Kombination mit Anthra-cyclinen konnte die prognostisch wichtige Rate kompletter Remissionen nach Induktionsbehandlung möglicherweise erhöht werden.

Literatur

- Barlogie, B.; Estey, E.; Kantarjian, H.; Plunkett, W.; Keating, M.; Cabanillas, F.; Freireich, E. J.: High dose Ara-C in hematologic malignancies – The M. D. Anderson experience. 13th Int. Congress of Chemotherapy. Proceedings. Part. 216, pp. 52-67 (1983).
- Capizzi, R. L.; Yang, J. L.; Cheng, E.; Cheng, J. C; Pre-clinical and clinical pharmacology of high-dose Ara-C (HiDAC): Aspects of “self potentiation” accounting for its unique therapeutic utility. 13th Int. Congress of Chemotherapy. Proceedings. Part 216, pp. 13-19 (1983).
- Estey, E.; Plunkett, W.; Keating, M.; Andersson, B.; McCredie, K.; Freireich, E.: High dose Ara-C in refractory acute leukemia: Clinical results and pharmacologic correlates. 13th Int. Congress of Chemotherapy. Proceedings. Part 216, pp. 44-48 (1983).
- Herzig, G. P.; Herzig, R. H.; Wolff, S. N.; Lazarus, H. M.; Phillips, G. L.: High-dose cytosine arabinoside therapy of acute non-lymphocytic leukemia. 13th Int. Congress of Chemotherapy. Proceedings. Part 216, pp. 49-51 (1983).
- Preisler, H. D.; Priore, R.: Prediction of response to therapy of acute nonlymphocytic leukemia (ANLL) with „high dose” cytosine arabinoside. 13th Int. Congress of Chemotherapy. Proceedings. Part 216, pp. 20-22 (1983).
- Rohatiner, A. Z. S.; Slevin, M. L.; Dhaliwal, H. S.; Lister, T. A.: High dose cytosine arabinoside (ara-C) in the treatment of acute leukemia. 13th Int. Congress of Chemotherapy. Proceedings. Part 216, pp. 33-38 (1983).
- Willemze, R.; Fibbe, W. E.; Zwaan, F. E.: Experience with intermediate and high dose cytosine arabinoside in relapsed and refractory acute leukaemia. 13th Int. Congress of Chemotherapy. Proceedings. Part 216, pp. 39-43 (1983).

Nachdrucke klassischer Werke der Medizin

S. Karger Verlag Abteilung Alleinauslieferung Postfach 2

8034 Germering

Abel, Heinrich Caspar

Wohlerfahrener Leib-Medicus der Studenten. Mit Anhang: Eine Nachricht aller Universitäten in Europa; Juramenta Academica; leges pro convictoribus; Studenten-Künste. In 1 Band. Leipzig 1698. 12^o. Mit Frontispiz. 11 Bl., 338 Seiten, 11 Bl., 45 Seiten, 7 Bl.

Ganzleinen DM 55,-

In diesem kleinen Vademecum findet der Leser die „nötigsten Regeln und herrlichsten Arzneyen, Krafft deren er nicht allein die Gesundheit (durch gute Diät und ordentliches Leben

unverrückt) erhalten, sondern auch die zuge-stoßenen Kranckheiten abwenden und vertreiben kann." Der Verfasser untersucht auf sehr unterhaltsame Weise „die Studenten-Kranck-heiten und deren Curen". Als Zugabe führt der Verfasser etliche sichere Mittel zum täglichen Gebrauch an: Studenten-Toback, schönes Zahnpulver u.a. Der letzte Teil vermittelt einige „Studenten-Künste" wie z.B. „eine ver-borgene Schrifft zu machen, die man anders nicht lesen kan, es werde denn der Brief durchs Wasser gezogen" oder „einen trunckenen Men-schen bald wieder nüchtern zu machen . . ."