Editorial

Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Beiträge vom letztjährigen Deutschen Krebskongreß repräsentieren verschiedene aktuelle Forschungsschwerpunkte über Tumornekrose-Faktor. Die großen Erwartungen, die in die Behandlung maligner Erkrankungen mit TNF gesetzt wurden, haben sich bislang nicht erfüllt. Pathophysiologische Untersuchungen haben aber gezeigt, daß TNF eine wichtige Rolle als zytotoxischer Faktor wie auch als hormonähnlicher Mediator von Entzündungsreaktionen und der zellulären Immunantwort spielt. Im folgenden sollen kurz die Biologie und die sich daraus ableitende potentielle klinische Bedeutung von TNF erläutert werden.

Die Bezeichnung Tumornekrose-Faktor beruht auf der Fähigkeit dieser Substanz, im Mausmodell eine hämorrhagische Nekrose bestimmter Sarkome zu bewirken, wenn tumortragende Tiere mit BCG und Endotoxin vorbehandelt wurden. TNF besitzt ferner eine In-vitro-Toxizität gegenüber transformierten Zelllinien, nicht aber gegen die meisten normalen Zelltypen. Die initial postulierte tumorspezifische Wirkung von TNF hat sich indes nicht bestätigt und es ist sogar wahrscheinlich, daß die Fähigkeit von TNF, Tumorzellen in vitro wie in vivo abzutöten, nicht die wichtigste Aktivität dieser Substanz ist. TNF besitzt vielfältige Wirkungen auf zahlreiche Gewebe und Organe, die sowohl vorteilhaft als auch schädlich im Sinne von Nebenwirkungen sein können. TNF ist ein nicht-glykosiliertes Polypeptid mit einem Molekulargewicht von 17 kd. Aktivierte Monozyten sind die wichtigste Quelle, TNF wird aber auch von Lymphozyten und NK-Zellen sezerniert. Zahlreiche Gewebe, einschließlich mesenchymaler, lymphatischer und hämopoetischer Zellen, besitzen spezifische Oberflächenrezeptoren mit hoher Bindungsaffinität, die vermutlich Glykoproteine von 75 kd sind. Gegenwärtig sind jedoch die Kenntnisse über den TNF-Rezeptor sowie über die Postrezeptor-Signalübertragung noch lückenhaft. Lymphotoxin, auch als TNF-beta bezeichnet, ist ein verwandtes Molekül mit ca. 30% Sequenzhomologie mit TNF, das sich an den gleichen Rezeptor bindet und nahezu identische Funktionen wie TNF besitzt. Bemerkenswerterweise ähneln sich auch die Aktivitätsspektren von TNF und Interleukin-1, obwohl sie strukturell nicht verwandt sind. TNF ist nicht ausschließlich ein Inhibitor von Tumorzellwachstum oder der Entwicklung normaler hämopoetischer Progenitorzellen (Burdach et al., Völkers et al.). TNF ist ein positiver Regulator von Entzündungs- und Immunreaktionen, wobei es mit zahlreichen anderen Zytokinen, z.B. Interferonen und Interleukinen, ein kompliziertes Netzwerk von sich wechselseitig beeinflussenden Signalen bildet (Hamprecht et al.). Klinische Phase-I/II-Studien zur Ermittlung der Wirkungen auf Tumorzellen und der Dosis-begrenzenden Toxizität wurden unter Einsatz unterschiedlicher Applikationsarten durchgeführt (Bartsch et al.). TNF wurde sowohl systemisch (i.v.-

Kurzinfusion, 24-h-Infusion) als auch intratumoral und intra-kavitär appliziert. Hierbei lagen die maximal tolerierten Dosen bei 200-300 µg/m² bei i.v.- und 400 µg/m² bei i.t.-Applikation. Eine günstige Beeinflussung des Tumorzellwachstums wurde bei mehreren hundert Patienten, die im Rahmen von Phase-I-Studien behandelt wurden, in etwa 5% gefunden. Therapeutische Effekte wurden vor allem bei Tumoren des Gastrointestinaltrakts und beim Hypernephrom beobachtet.

Möglicherweise lassen sich diese enttäuschenden Ergebnisse auf die erheblichen Nebenwirkungen zurückführen, aufgrund derer die maximal tolerierten TNF-Konzentrationen für eine Lyse der Tumorzellen unzureichend sind.

Dosisbegrenzend sind vor allem Blutdruckabfälle, Tachykardie, Fieber, Schüttelfrost, Wasserretention, Somnolenz und Verwirrtheit. Diese Nebenwirkungen sind zumeist dosisabhängig und werden vielfach indirekt durch TNF-induzierte Mediatoren ausgelöst; sie lassen sich gut durch die bekannten patho-physiologischen Effekte von TNF erklären. TNF-induziertes Fieber kommt sowohl durch eine vermehrte Prostaglandin-Synthese im Hypothalamus zustande als auch indirekt durch Stimulation zellulärer Interleukin-1-Synthese. Gerinnungsstörungen und das für die Wasserretention verantwortliche «capillary leak syndrome» lassen sich durch eine Aktivierung vaskulärer Endothelzellen erklären sowie durch gesteigerte Interaktion von Endothelzellen und Leukozyten. Bei Granulozyten und Eosinophilen stimuliert TNF den oxidativen Stoffwechsel, die Adhärenz an Endothelzellen, die Phagozytose-Aktivität und die Zytotoxizität gegenüber bestimmten Pathogenen. Klinisch äußert sich die Aktivierung dieser Zellen auch in einer Akkumulation von Neutrophilen in der Lunge. Angesichts der Resultate bisheriger klinischer Studien ist der zukünftige Stellenwert von TNF in der klinischen Anwendung zur Zeit völlig ungewiß.

Die Kopplung von TNF und tumorspezifischem molekularem Antikörper, die Beeinflussung der Tumorperfusion (Kallinowski et al.) oder der effektivere Einsatz von Antagonisten der TNF-Nebenwirkungen sind denkbare Ansätze, um eine Dosiserhöhung am Tumor zu erreichen. Von großem Interesse sind weiterhin Kombinationen von TNF mit Zytostatika (Klapdor et al.) oder mit anderen Zytokinen, zumal TNF einen synergistisch gesteigerten inhibitorischen Effekt mit Interferonen auf das Tumorzellwachstum in vitro ausübt, oder die Erkennung von Resistenzmechanismen (Pfreundschuh et al.). TNF sollte jedoch nicht ausschließlich unter dem Aspekt seines direkten Antitumoreffektes betrachtet werden, sondern auch als Regulator des Immunsystems und der Hämatopoese. Um diese Wirkungen auch therapeutisch nutzbar zu machen, sind genaue Kenntnisse seiner physiologischen und pathophysiologischen Effekte erforderlich. Aus diesem Grund widmen sich auch die meisten Beiträge dieses Heftes solchen pathophysiologischen Fragestellungen.

D. Hoelzer, O. G. Ottmann, Frankfurt