Toracoplastiche integrative nei soggetti trattati con aspirazione endocavitaria e rifamicina SV per via locale

E.

Micillo

Clinica Tisiologica dell'Università, Napoli (Italia)

Indirizzo dell'autore: Dr. E. Micillo, Clinica Tisiologica dell'Università, Napoli (Italia)

Presso la Clinica Tisiologica dell'Università di Napoli, novantadue soggetti affetti da tubercolosi polmonare cavitaria sono stati sottoposti al trattamento di aspirazione endocavitaria in associazione all'uso locale di rifamicina SV; in ventisette casi (pari al 29,3%) è stato necessario integrare il trattamento con un intervento di toracoplastica di copertura.

Le toracoplastiche di integrazione clinico-biologica sono, come è noto, quelle che vengono effettuate allo scopo di dominare i focolai circostanti alla caverna trattata o piccole ulcerazioni non suscettibili di aspirazione endocavitaria ed in generale quei processi nei quali la caverna non costituisce l'unica componente attiva.

Nei casi trattati con rifamicina SV in associazione all'aspirazione endocavitaria, l'incidenza di questo tipo di toracoplastica non è apparsa sensibilmente modificata rispetto ai soggetti trattati in altro modo; infatti è noto che la rifamicina SV, agendo esclusivamente in superficie, limita i suoi cospicui effetti allo spazio cavitario entro cui viene immessa. Particolarmente significativi appaiono in proposito quei dati batteriologici rilevati in simili processi in cui ad una stabile negatività del secreto endocavitario si contrapponeva la persistente positività del Tspettorato. Ovviamente l'attuazione di simili toracoplastiche è stata notevolmente agevolata dalla detersione della caverna aspirata e trattata con rifamicina SV.

Esiguo è stato invece il numero delle toracoplastiche effettuate con finalità meccaniche o di sicurezza: infatti la rifamicina SV con la sua rapida azione sulle componenti anatomiche e batteriologiche della caverna e con la conseguente guarigione delle lesioni del bronco di drenaggio, ha assicurato nelle caverne isolate guarigioni rapide e complete, fornendo in tal modo le necessarie garanzie di stabilità

566

MICILLO

anche quando le condizioni anatomico-funzionali del parenchima circostante non corrispondevano a quelle ottimali.

È quindi nel campo delle toracoplastiche effettuate con le modalità suddette che la rifamicina SV ha apportato una evidente riduzione.

Zusammenfassung

Die Frequenz der integrativen Thorakoplastiken bei Patienten mit Lungen-tuberkulose, die einer Behandlung mit endokavitärer Aspiration und gleichzeitiger Behandlung mit Rifamycin SV unterzogen worden waren, unterscheidet sich nicht von der Frequenz bei mit anderen Methoden behandelten Patienten. Die Ausführung der Plastiken wurde aber sehr erleichtert.

Summary

The incidence of integrative thoracoplasty in subjects suffering from pulmonary tuberculosis and submitted to endocavitary aspiration and simultaneous rifamycin SV treatment did not differ from that seen in subjects treated in other ways. The operation, however, was markedly facilitated.

Resume

L. La fréquence des thoracoplasties d'intégration chez des sujets affectés de tuberculose pulmonaire cavitaire soumis à l'aspiration intra-cavitaire et au traitement simultané par la rifamycine SV ne diffère pas de celle observée chez des sujets traités par d'autres méthodes. L'intervention a été cependant notablement facilitée.