HIV-Infektionssicherheit von Blutkonserven aus Deutschland

L.

Gürtler

München

Prof. Dr. L. Gürtler, Max-von-Pettenkofer-Institut, für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie der, Ludwig-Maximilians-Universität München, Pettenkoferstraße 9a, D-80336 München (BRD)

Es jährt sich zum ersten Mai, daß mit einer strategisch gut inszenierten Presseunterstützung das Blutkonservenpotential für die HIV-Übertragung in Deutschland erst als höchst gefährlich und anschließend (Annoncen des Gesundheitsministeriums vom 27. November 1993, unterschrieben vom Minister) als unbedenklich dargestellt wurde. In diesem Heft von INFUSIONSTHERAPIE und TRANSFUSIONSMEDIZIN erscheinen nun 2 Arbeiten von den kommunalen und den Rot-Kreuz-Blutspendediensten [1,2], die die Nachforschungsanalysen über das restliche HIV-Übertragungspotential in Deutschland wiedergeben. Demnach liegt – wie nicht anders erwartet und von den informierten Fachleuten auch 1993 berechnet – die Restwahrscheinlichkeit einer HIV-Übertragung bei 1 in einer Million Spenden.

Beide Arbeiten sind eine hervorragende Dokumentation für Aussagen, nicht nur für den Arzt, der dem transfusionsbedürftigen Patienten Auskunft geben muß, nicht nur für den Blutspendedienst, der die laufenden Sicherheitsbestrebungen beurteilen muß, sondern auch für den gesundheitspolitisch Interessierten, der den Beitrag des Ministeriums für Maßnahmen zur Transfusionssicherheit in der Vergangenheit und in der Zukunft werten sollte.

Zu beiden Studien sollten jedoch einige Fragen gestellt werden, um ihre Bedeutung werten zu können.

Ist die Zeit von 6 Monaten für die Kontrolluntersuchung von Empfängern einer von einem jüngst HIV-serokonvertierten Spender stammenden Blutkonserve ausreichend? Imagawa et al. [3] glaubten mit ihrer Arbeit bewiesen zu haben, daß HIV-infizierte Homosexuelle in 30% der Fälle länger als 3 Jahre anti-HIV-negativ bleiben können, bevor der Anti-HIV-Test anspricht. Diese Arbeit verführte Haseltine [4] zur Aufstellung des Bildes einer schlummernden HIV-Infektion, deren Unsichtbarkeit länger als 4 Jahre betragen kann. Zusätzlich war im Jahre 1988 von Farzadegan et al. [5] die Seroreversion postuliert worden; diese Autoren glaubten entdeckt zu haben, daß HIV-infizierte das Virus wieder eliminieren und dann Antikörper-negativ, aber vielleicht dennoch infektiös sein können.

Es ist einfach, heute rückblickend festzustellen, daß HIV nicht anders als die üblichen Infektionserreger eine zügige Immunantwort auslöst (was auch 1989 bereits beschrieben wurde [6])

und daß damit das 6-Monatsintervall eine sichere Zeitspanne darstellt.

Warum werden vom ehemaligen BGA mehr HIV-infizierte Transfusionsempfänger gemeldet und welche Konsequenzen müssen daraus gezogen werden?

Die Zahlen der beiden Arbeiten in INFUSIONSTHERAPIE und TRANSFUSIONSMEDIZIN [1, 2] einerseits und die des BGA sind nicht zu vergleichen. In den Rückuntersuchungen [1, 2] werden die gemeldeten HIV-infizierten Empfänger und die transfundierten Spenden untersucht

und nur die Infektionen gezählt, bei denen auch ein HIV-infizierter Spender involviert gewesen ist. Für die Solidität der Studien spricht, daß nicht alle gemeldeten Fälle abgeklärt werden konnten: es handelt sich um bis zu 40% in der Arbeit von Glück et al. [2] und um nur wenige Fälle in der Arbeit von Zeiler et al. [1]. Das BGA muß alle Angaben auf den Meldebögen verwerten, unabhängig davon, ob sie plausibel sind und ob sich Doppelmeldungen sicher ausschließen lassen.

Eine Konsequenz aus der Diskrepanz der Zahlen ist, daß immer wieder versucht werden wird, eine HIV-Infektion als Folge einer transfundierten Blutkonserve zu erklären. Die zweite Konsequenz ist, zu dokumentieren und festzustellen, welche zusätzlichen aus Blut hergestellten Präparate ein Transfusionsempfänger bekommen hat; anders ist eine Risikobewertung nicht möglich. Die dritte Konsequenz ist, auch wegen zukünftiger rechtlicher Ansprüche Vorsicht walten zu lassen und von jedem Transfusionsempfänger vor der Transfusion 250 µl Serum zu asservieren, damit in dieser Probe im Zweifelsfall der Anti-HIV-Test durchgeführt werden kann. Technisch ist dies kein Problem, wenn Mikrotiterplatten verwendet werden, die zugeklebt und eingefroren einfach identifizierbar und stapelbar sind, und die nach einem Zeitraum von 5 Jahren verworfen werden können.

Was sind Blut, Blutkomponenten und Blutprodukte, und haben diese die gleiche HIV-Übertragungswahrscheinlichkeit wie Blutkonserven?

Eine Blutkonserve ist normalerweise Vollblut. Wie in beiden Arbeiten [1,2] beschrieben, wird zunehmend fraktioniert, d. h. Patienten erhalten Erythrozytenkonzentrate und FFP (fresh frozen plasma). Somit müßte sich, wenn beide Komponenten

© 1994 S. Karger GmbH, Freiburg

gegeben werden und von verschiedenen Spendern stammen, das Risiko verdoppeln [7]. Bei 1 in einer Million ist diese Steigerung des Risikos aber nicht meßbar. Gepoolte Thrombozytenkonzentrate werden normalerweise aus 4 Konserven hergestellt, so daß sich das Risiko vervierfachen müßte. Gemessen werden kann diese Risikosteigerung nicht. Darüber hinaus werden für die Spende am Zellseparator nur Dauer-spender verwendet, die nach weltweiten Untersuchungen das geringste HIV-Erwerbsrisiko haben. Auch deswegen wird die Risikosteigerung nicht meßbar.

Blutprodukte sind aber auch die Gerinnungsfaktoren VIII, IX und auch XIII. Nachdem das Spendenaufkommen in Deutschland für die Herstellung dieser Gerinnungspräparate nicht ausreicht, haben Blutprodukte prinzipiell ein anderes, höheres HIV-Übertragungsrisiko als die Blutkonserven. Durch die Einführung der Inaktivierung von Infektionserregern in diesen Präparaten ist das Risiko theoretisch noch geringer als in Blutkonserven. Dennoch sollten Blutprodukte- und Blutkonserven-Risiko streng getrennt werden, da gelegentliches Vorhandensein von Infektionserregern auch nach 1985 in einzelnen Präparaten vorgekommen ist; als Beispiele seien HIV [8] und HAV [9] genannt. Infektionsübertragungen durch Blutpräparate sollten zeitlich gebündelt vorkommen und am schnellsten bei Patienten entdeckt werden, die kontinuierlich große Mengen infundiert bekommen, z.B. die Hämophilen.

Werden wir zukünftig mit dem gleichen, niedrigen HIV-Übertragungsrisiko rechnen können? Die Höhe des HIV-Übertragungsrisikos ist neben der Spender-selektion und der Spendertestung auch abhängig von der

Epidemiologie von HIV in der deutschen Bevölkerung. Die Prävalenz von HIV ist zur Zeit mit etwa 0,1% gering [10]. In den letzten 4 Jahren hat – wenn das überhaupt meßbar ist – kein Abfall der Prävalenz stattgefunden. Die HIV-Prävalenz wird aber eben nicht von den HIV-

Übertragungen durch Blut und Blutprodukte beeinflusst, sondern ganz wesentlich durch den Sexualverkehr und Drogengebrauch. HIV erwerben können Deutsche auch als Touristen in Ländern wie Thailand, wo etwa 85% der Prostituierten HIV-infiziert sind [11]. Die Prävalenz von HIV in Blutspendern ist somit eng gekoppelt an die Prävalenz in der spendebereiten allgemeinen Bevölkerung und davon auch nicht zu trennen. Nachdem die HIV-Prävalenz langfristig nicht berechenbar ist, ist somit die oben gestellte Frage nicht zu beantworten. Eins kann jedoch gesagt werden: Die HIV-Prävalenz niedrig zu halten, ist nicht allein Aufgabe der Blutspendedienste, sondern vor allem eine Aufgabe gesundheitspolitischer Aktivitäten. Bei einer täglichen HIV-Neuinfektionsrate in Deutschland von über 10 (wahrscheinlich 14) nehmen sich die 16 Infektionen durch Blutkonserven von 1985 bis 1992, also nach Einführung der Anti-HIV-Tests, gering aus. Um auf den Jahrestag des sogenannten Blutskandals zurück-zukommen: Dieser wäre eine Gelegenheit, von ministerieller Seite vielleicht neue Aktivitäten zur Einschränkung der HIV-Übertragung ganz allgemein aufzubauen, nachdem bewiesenermaßen die strategischen Segel im Aufwind der Presse durch das Ministerium schnell gestrafft werden können. Nutz-nießer einer Reduktion der HIV-Übertragung wären wir alle, mit weniger Kranken, mit weniger Arbeitsausfall in jungen Jahren, mit weniger Waisen, mit weniger persönlich tragischen Schicksalen – und mit weniger infizierten Blutspendern.

Literatur

Zeiler T, Kretschmer V, Sibrowski W, et al: Eine retrospektive Untersuchung zur Praxis der «Look-back»-Verfahren, zur Inzidenz HIV 1/2-positiver Blutspender und zum Risiko der transfusionsassoziierten HIV-Infektion bei den staatlich-kommunalen Blutspendediensten in Deutschland. Infusionsther Transfusionsmed 1994;21:362-367.

Glück D, Elbert G, Dengler T, Gossrau E, Gräßmann W, Grimm M, Holzberger G, Sternberger J, Weise W, Kubanek B: HIV-Lookback-Studie der DRK-Blut-spendedienste in der BRD. Infusionsther Transfusionsmed 1994;21:368-375.

Imagawa DT, Lee MH, Wolinsky SM, Sano K, Morales E, Kwok S, Sinsky JJ, Nishanian PG, Giorgi J, Fahey JL, Dudley J, Visscher BR, Detels R: Human immunodeficiency virus type 1 infection in homosexual men who remain seronegative for prolonged periods. N Engl J Med 1989;320:1458-1462.

4 Haseltine WA: Editorial: Silent HIV infection. N Engl J Med 1989;320:1487-1489.

5 Farzadegan H, Polis A, Wolinsky SM, Rinaldo CR, Sinsky JJ, Kwok S, Griffith RL, Kaslow AK, Phair JP, Polk BF, Saah AJ: An Intern Med 1988;108: 785-790.

6 Horsburgh CR, Ou CY, Jason J, Holmberg SD, Longini IM, Schable C, Mayer KH, Lifson AR, Schochetman G, Ward JW, Rutherford GW, Evatt BL, Seage GR, Jaffe HW: Duration of human immunodeficiency virus before detection of antibody. Lancet 1989;ii:637-640.

7 NIH, Medical Applications of Research: Fresh-frozen plasma. Indications and risks. JAMA 1985;253: 551-553.

Kleim J, Bailly E, Schneeweis K, Brackmann H, Hammerstein U, Hanfland P, van Loo B, Oldenburg J: Acute HIV-1 infection in patients with hemophilia B treated with b-propionolactone-UV inactivated clotting factor. Thromb Haemost 1990;64:336-337.

Peerlinck K, Vermeylen J: Acute hepatitis A in patients with hemophilia A. Lancet 1993;341:179.

Hamouda O, Voß L, Kiehl W, Siedler A, Kollan C, Baars C, Kotzur KH, Meyer B, Schwartländer B, Koch MA: AIDS/HIV 1993. Bericht zur epidemio-logischen Situation in der

Bundesrepublik Deutschland zum 31.12.1993. AZ-Hefte 20/1994. Bundesgesundheitsamt, Berlin, 1994.

Celentano DD, Akarasewi P, Sussman L, Suprasert S, Mantanasarawoot A, Wright NH, Theetranont C, Nelson KE: HIV-1 infection among lower class commercial sex workers in Chiang Mai, Thailand. AIDS 1994;8:533-537.

361