Le lymphoréticulosarcome primitif du testicule

J.-P.		Paunier
G.		Candardjis

Lausanne

Adresse des auteurs: Prof. G. Candardjis et Dr J.-P. Paunier, Institut Universitaire de Radiologie de Lausanne (Suisse)

(Resume. L'article original a paru dans Radiologia Clinica, Vol. 32, pp. 112–120 [1963]).

Il s'agit d'une tumeur rare puisqu'on en a jusqu'à présent décrit 39 cas dans la littérature. Les auteurs en présentent deux nouveaux cas, dont un est encore en vie en excellente sante apparente plus de 6 ans apres traitement. On ne connait que deux autres cas de guerison de plus de 5 ans, Fun publie en 1952 et l'autre en 1955. Les auteurs precisent quelques donnees concernant cette tumeur assez parti-culiere et exposent les principaux caracteres qui la differentient du seminome sur le plan clinique.

Schweiz. Nationalliga Krebsbek. Jahresvers. Schaffhausen 1962 Oncologia 16: 186 (1963)

Spontantumoren der Mans als ehemothérapeutisches Versuchsmodell

Von P. LOUSTALOT, G. PIETRA und W. STAMM, Basel

Es wird iiber die Methodik chemotherapeutischer Untersuchungen an spontanen

Brustdrusentumoren der C3H Inzuchtmaus berichtet. Anhand von Behandlungsergebnissen mit Cortisonacetat

Triaethyl-enmelamin und Testosteronpropionat werden die notwendigen Kautelen die bei dieser Versuchsanordnung notwendig sind

und die mogliche Bedeutung des Testsystems fiir chemotherapeutische Untersuchungen besprochen.