Quelques problèmes concernant l'eczéma expérimental (difficultés, erreurs, résultats contradictoires)

W.		Jadassohn
N.		Hunziker

Clinique Universitaire de Dermatologie, Genève (Directeur: Prof. W. Jadassohn)

Adresse des auteurs: Prof. Dr W. Jadassohn et Dr N. Hunziker, Clinique Universitaire de Dermatologie, Hôpital Cantonal, Genève

1) Essais de sensibilisation eczémateuse du cobaye avec des substances chimiquement connues.

Les auteurs parlent des essais faits avec le nickel, la phenylhydrazine, la thioglycérine, le bichromate de potassium et la paranitrosodiméthylaniline.

2) A propos de la désensibilisation dans l'eczéma.

Experiences avec le dinitrochlorobenzène chez le cobaye. Désensibilisation générale et désensibilisation locale (nous ne savons pas si la désensibilisation est spécifique et si elle est persistante).

Prednisone et triamcinolone dans l'eczéma au dinitrochlorobenzène chez le cobaye. Nous n'avons pas pu démontrer d'effet.

L'eczéma au dinitrochlorobenzène chez de très jeunes cobayes.

Si on commence le traitement le deuxième jour de la vie, on peut démontrer l'eczéma le 16ème jour de la vie. Les cobayes peuvent présenter des vésicules subcornéennes; les contrôles non sensibilisés du même âge n'en présentent pas.

* Les experiences ont été faites en partie grâce à un subside du fonds national suisse pour la recherche scientifique. Paraîtra in extenso dans la Revue Française d'Allergie.