Syndrome Lucky-Luke

J.		Goens
J.		De Maubeuge
G.		Achten

Clinique Dermatologique, Hôpital Saint-Pierre, Bruxelles, Belgique

Prof. G. Achten, Clinique Dermatologique, Hôpital Saint-Pierre, Rue Haute 322, B-1000 Bruxelles (Belgique)

Société Beige de Dermatologie et de Syphiligraphie Belgische Vereniging voor Dermatologie en Syfiligrafie

Anamnèse. Antécédents personnels: cancer du sein généralisé avec métastases osseuses et hépatiques. Aspect clinique: concomitamment à une cure polychi-miothérapique, la patiente reçoit une série d'injections intra-musculaires de Konakion (vitamine K), à raison d'une par jour durant 8 jours, alternativement au niveau des quadrants fessiers supéro-externes. Elle constate, au lendemain de la dernière injection, l'apparition de placards érythémateux bilatéraux symétriques aux endroits d'injection, d'extension progressive et s'accompagnant graduellement de prurit. Dans les 4 semaines qui vont suivre, l'évolution se fera vers l'extension symétrique des placards à toute la région fessière supéro-externe et trochantérienne, puis vers le passage de l'érythème à une pigmentation irrégulière «vieil ivoire». L'infiltration est modérée, l'adhérence discrète, le prurit stationnaire.

Traitement et évolution. L'application locale d'un onguent corticoïde entraîne la disparition de la composante squameuse et du prurit endéans les 3 semaines. Les placards restent par contre stationnaires quant à leur taille, leur pigmentation et leur infiltration.

1 Fait clinique présenté à la séance du 23 novembre 1985.

N.S., femme de 78 ans.

Commentaire. Ces lésions, résultant d'une fibrose dermo-hypodermique suivant une réaction inflammatoire non spécifique, apparaissent suite à l'injection de vitamine K1 huileuse [1]. Ni l'administration intra-musculaire, ni la présence d'autres molécules dans l'excipient, ni la présence d'une pathologie hépatique ne sont, comme suppose antérieurement, des facteurs indispensables au déclenchement de ces lésions dont le mécanisme est largement hypothétique [2].

Bibliographie

Texier L, Genckx P, Gauthier O, Gauthier Y, Sur-leve-Bazeille JF, Boineau D: Hypodermite scléro-dermoforme lombo-fessière induite par des injections médicamenteuses intra-musculaires associées à la vitamine K1. Ann Dermatol Syphiligr 1972;99:363-372.

Rommel A, Saurat JH: Hypodermite fessière scléro-dermoforme et injections de vitamine K1 à la naissance. Ann Pediatr 1982;29:64-66.