Erythema Gyratum Repens bei metastasierendem Adenocarcinom des Magens

A.	Eichmann
----	----------

H.L., geb. 1909, männl.

Anamnese. Der Patient erkrankte im Oktober 1985 an einem generalisierten, schuppenden, leicht gyrier-ten Erythem. Internmedizinische Untersuchungen er-gaben keine Neoplasie. Die Hautveränderungen persi-stierten trotz symptomatischer Therapien (Prednison, Vitamin A-Säure parenteral). Im März 1986 erfolgte eine erneute Hospitalisation zur Abklärung.

Befunde. Haut: Generalisiertes Erythem mit gy-rierter und retikulärer Zeichnung; collerette-artige Schuppung (Abb. 1). Histologie der Haut: Unregel-mässige Akanthose, Orthokeratose und mässig peri-vaskuläre lympho-histiozytäre Infiltrate.

Internmedizinische Abklärung. Computer-Tomo-graphie des Abdomens: Multiple Lebermetastasen, Wandverdickung an der grossen Kurvatur mit unregel-mässiger Ausfransung zum angrenzenden Fettgewebe. Verdacht auf Magencarcinom mit Infiltration des be-nachbarten Fettgewebes. Feinnadelpunktion der Le-ber: Verschleimendes Adenocarcinom. Gastroskopie mit Biopsien und Aspirationszytologie: grosser intra-muraler Magentumor; zytologisch maligne Zellen eines Adenocarcinoms (gleichartige Zellen wie aus dem Leberaspirat).

Therapie und Verlauf. Wegen Inoperabilität (meta-stasierender Tumor, Alter) wurde eine Chemotherapie mit FAM (5-Fluorouracil, Adriamycin, Mitomycin C) eingeleitet. Lokaltherapie: Rückfettende Massnahmen und Hydrocortisonsalbe. Jeweils im Anschluss an die Chemotherapie wurde eine auffällige Besserung des Hautbefundes registriert.

Kommentar. Beim Erythema gyratum repens (Erstbeschreibung von Gammel 1952) [1] handelt es sich um eine fast obligate Paraneoplasie. Die Carzino-me werden bevorzugt in den Lungen, Magen-Darm, Mamma und Uterus gefunden [2]. Sind die Maligno-

Abb. 2. Computer-Tomographie des Abdomens.

me therapierbar, beobachtet man meist eine Regre-dienz der Hautveränderungen [3]. In jüngster Zeit wurden zwei Fälle von Erythema gyratum repens beobachtet, bei denen bis zum Ableben des Patienten kein Malignom gefunden werden konnte [4].

Literatur

Gammel JA: Erythema gyratum repens. Arch Der-matol 1982;66:494–505.

Hagedorn M, et al: Paraneoplasien, Tumorsyndromen und Tumorsyndrome der Haut. Wien, Springer, 1978.

Storck H

Schnyder UW

Schwarz K: Erythema gyratum repens bei Hypopharynxcarcinom. Dermatologica 1962;124:289–295.

Langlois JC

et al: Erythema gyratum repens associated with internal malignancy. J Am Acad Dermatol 1985;12:911–913.