Epithélioma spinocellulaire du talon se développant sur un lichen plan érosif

G.		De Dobbeleer
T.		Brasseur
M.		Ledoux

Clinique de Dermatologie (Prof. G. Achten), Université de Bruxelles, Belgique

Dr G. De Dobbeleer, Clinique de Dermatologie et de Syphiligraphie, Hôpital Universitaire **Saint-Pierre**, 322, rue Haute, B-1000 Bruxelles (Belgique)

Observation (HSP 3686/79)

La patiente, âgée de 66 ans, souffre d'un lichen plan generalise depuis 1955. Ce lichen est parfois bulleux puis érosif. Les recidives sont frequentes; les lesions sont bien contrôlées jusqu'en 1964 par une corticothérapie générale. A cette date, l'apparition d'une pancreatite necessite l'arrêt de ce traitement. En 1974, la patiente presente un epithelioma spinocellulaire au niveau de la plante du pied droit développé sur une lesion erosive d'origine lichénienne.

L'épithélioma est excise chirurgicalement et une greffe est pratiquée. En juillet 1979, la patiente consulte pour une récédive d'épithélioma spinocellulaire située cette fois au talon droit. La tumeur, dont le diamètre atteint 3 cm, est verruqueuse, brunâtre et ulcérée.

L'examen anatomo-pathologique confirme le diagnostic de lichen plan bulleux et d'épithélioma spinocellulaire.

L'épithélioma spinocellulaire est excise chirurgicalement en août 1979, avec pose de greffe prélevée sur la cuisse droite. La cicatrisation s'effectue sans problème.

La dégénérescence maligne du lichen plan des muqueuses est une donnée bien établie alors que la transformation maligne d'un lichen plan de la peau glabre est exceptionnelle [1]. Des facteurs prédisposants doivent toujours être recherchées à cette occasion (prise prolongée d'arsenic, radio-thérapie préalable).

Bibliographie

1 Kronenberg, K., Fretlin, D. and Potter, B.: Malignant degeneration of lichen planus. Archs Derm. 104: 304-307 (1971).