60. Jahresversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Dermatologie und Venereologie 13. und 14. Oktober 1978 in Bern

Dermatologica, 1979;159:400-401

Les associations fongiques en pathologie cutanée

D.		Grigoriu
J.		Delacrétaz

Clinique universitaire de **dermato-vénéréologie** (Directeur: Prof. *J. Delacrétaz*), CHUV, Lausanne

Prof. Dr J. Delacrétaz, Clinique universitaire de **dermato-vénéréologie**, CHUV, CH-1011 Lausanne

Tableau I.

Espèces fongiques associées isolées Total Affections (localisations)
eczema herpes mycoses ony- SMF CAE mycosesmar- circiné pieds chomy- intesti-
giné coses nales
pieds

T. rubrum + T. mentagrophytes asteroides
+ Rodothorula 1

T. rubrum + E. floccosum 6

T. rubrum + C. albicans + E. floccosum 2

T. rubrum + Scopulariopsis brevic. 2T. rubrum + Scopulariopsis brevic.

+ C. Krusei 1T. rubrum + C. albicans 12

T. interdigítales + C. albicans 1

T. interdigítalis + E. floccosum 3

T. mentagrophytes asteroides + C. albicans 4

E. floccosum + C. albicans 4E. floccosum + T. mentagrophytes asteroides 1

E. floccosum + Pityrosporum 3

E. floccosum + Corinaebacterium 4

M. gypseum + M. cookei 1

A. fumigatus + C. albicans 5

A.fumigatus + A. niger 2

A. fumigatus + Rhizopusssp. 1

A. niger + C. albicans 3

A. niger + A. nidulans 1

C. albicans + Geothricum candidum 2

1 Travail présenté in extenso à la Société suisse de Dermatologie et Vénereologie, Berne 13 et 14 octobre 1978.

Les associations fongiques en pathologie cutanée

401

Resume

Les auteurs présentent leur experience des deux dernières années concernant les associations fongiques.

Sur un total de 5057 cultures positives, ils ont mis en évidence 59 associations (1,1% des cas, tab. I).

Selon eux

L'association fongique est un phénomène assez rare sans être pour autant exceptionnel. L'interprétation est parfois difficile mais nécessaire et importante. Le traitement et la révélation en dépendent souvent.