Dermatologica, 1970;141:187

Démonstrations – Demonstrationen

J.D.		Geiser
J.		Arnold

Lausanne

Syringomes multiples «explosifs»

Cas exceptionnel par l'apparition brusque, en deux mois, chez une patiente de 48 ans, de plusieurs centaines de lésions papulo-nodulaires des paupières inférieures, du front et de la lèvre supérieure et dont l'examen histologique confirme le diagnostic de syringomes.

Morphée généralisée à évolution particulière

Patiente de la polyclinique médicale (Prof. Dr Ed. Jéquier-Doge), âgée de 60 ans, dont l'affection a débuté il y a 2 ans par un syndrome de Raynaud bilatéral des membres supérieurs. Puis, à la suite d'un épisode fébrile, des nodules sous-cutanés se développent au niveau de la ceinture pelvienne. Ils se multiplient et forment de vastes plaques infiltrées, à consistance œdémateuse, occupant le décolleté, les épaules, les membres supérieurs, les seins, la ceinture pelvienne, les cuisses. Les mains, les pieds, le visage et le cou ont toujours été indemnes. Le diagnostic de sclérodème de Buschke est alors discuté. Un traitement à la pénicilline, puis à l'EDTA, sont mal supportés. Les lésions s'aggravent et deviennent franchement scléreuses. Un traitement au Primolut, selon Holzmann et coll. (Aust. J. Derm. 9: 237–240, 1968) est pratiqué pendant 10 mois, associé avec de petites cures de prednisone, nécessitées surtout par un syndrome du tunnel carpien bilatéral. Au cours de cette période, l'affection semble s'être stabilisée. Actuellement, sous cure de Vibramycine, on constate une nette amélioration de la maladie, qui prend l'aspect de sclérodémie en plaques multiples, mais sans «lilac ring». La dernière biopsie, pratiquée 15 jours avant la présentation montre un fragment de peau recouvert d'un épiderme mince, pauvre en crêtes interpapillaires. Le derme est très épais. Les faisceaux collagènes sont épaissis, serrés, homogénéisés. Dans le derme superficiel, des capillaires sont dilatés et entourés d'un manchon lymphocytaire. Leur paroi est parfois tuméfiée. Les fibroblastes sont peu abondants. Pas de glandes sudoripares sur les coupes examinées.