Dermatologica, 1967;135:219-220

Vaccinia-antigène dans l'herpès récidivant

U.

Schmid

Yverdon

Adresse de l'auteur: Dr U. Schmid, 18, rue St-Roch, CH-1400 Yverdon (Suisse)

Etant donné les résultats peu satisfaisants qu'obtient le médecin avec les moyens employés jusqu'à présent dans le traitement de l'herpès récidivant et des aphtes récidivants, il me semble justifié d'essayer en pratique toute nouvelle préparation digne d'intérêt. Me basant sur une communication verbale de Söltz-Szöts, j'ai entrepris des vaccinations avec un vaccin-antigène* (V. A.) dans 12 cas d'herpès et d'aphtes récidivants dont 3 avaient déjà reçu auparavant sans succès 1 série de vaccins varioliques (Var.) «Lancy-Vaxina». Le tableau I donne les renseignements détaillés sur les 12 malades traités. Le schéma de traitement est en outre analogue à celui des vaccinations classiques avec le «Lancy-Vaxina», c'est-à-dire 1 inoculation tous les 10 jours environ.

Les résultats obtenus paraissent prometteurs et l'essai du V. A. sur une plus grande échelle surtout dans les cas rebelles au vaccin vario-lique me semble valoir la peine.

Resume

Le Vaccinia-antigène (Behring) a été utilisé dans 12 cas d'herpès récidivant et d'aphtes récidivants. Des résultats satisfaisants ont été obtenus.

Summary

Twelve cases of relapsing herpes and relapsing aphthae have been treated by means of Vaccinia-Antigen (Behring). The results obtained were satisfactory.

* Le Vaccinia-antigène (Behring) (agent général pour la Suisse: Institut Sérothérapique et Vaccinal, Berne) est préconisé par le fabricant pour enrayer le danger de complications neurales lors de primovaccinations antivarioliques chez les sujets âgés de plus de 3 ans. L'antigène utilisé est fabriqué à partir de cultures tissulaires du virus vaccinia préalablement inactive au moyen de formol. Les ampoules contiennent en outre de l'hydroxyde d'aluminium dans le but de renforcer l'effet immunisant de l'antigène.

220 Schmid, Vaccinia-antigène dans l'herpès récidivant

TABLEAU I

Zusammenfassung

Vaccinia-Antigen (Behring) wurde in 12 Fällen von rezidivierendem Herpes und rezidivierenden Aphthen angewandt. Es wurden befriedigende Resultate erzielt.