XLVIII. Jahres-Versammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Dermatologie und Venereologie am 15. und 16. Oktober 1966 in Bern

Dermatologica, 1967;135:221

I. Mitteilungen – Communications A propos de la griséofulvine

W.	Jadassohn
----	-----------

Clinique Universitaire de Dermatologie (Dir.: Prof. W. Jadassohn), Genève

Adresse de l'auteur: Prof. Dr W. Jadassohn, Clinique dermatologique universitaire, Hôpital Cantonal, CH-1200 Genève (Suisse)

D'après les résultats obtenus par H. Lozeron, R. Brun, P. Gaudín, A. Maggiora et jB. Vidmar
Nous n'avons pas pu démontrer un effet œstrogène ni un effet stathmocinétique de la Griséofulvine au niveau de la tétine du cobaye. Nous avons pu rendre une souche d'Achorion Quinckeanum résistante à la Griséofulvine in vitro et in vivo. Contrairement à la Griséofulvine, le Griséofulvol, l'acide griséofulvique et la colchicine n'empêchent pas (ou beaucoup moins) la poussée de l'Achorion Quinckeanum et la regeneration de la planaria gonocephala décapitée. Testées sur Vicia faba equina, les 4 substances empêchent la poussée de racines secondaires.

* A paru in extenso dans Dermatologica, volume jubilaire en l'honneur du Prof. Prakken.
16 Dermatologica, Vol. 135, No. 3 (1967)