II. Démonstrations – Demonstrationen

A.		Franceschetti
F.		Ammann
W.		Jadassohn
R.		Paillard

Genève

Trois cas de syndrome de Groenblad-Strandberg dans une famille St. Paul, 1932, N° P. 1214/62
St. Peter, 1896, N° P. 1215/62 St. Josef, 1891, N° 1216/62

Clinique universitaire de dermatologie, Genève
149

Les deux frères, nés respectivement en 1891 et 1896, présentent à côté du pseudo-xanthome une dégénérescence chorio-rétinienne du pôle postérieur, type pseudo-inflammatoire de Sorsby (Fig. 1), tandis que seul le fils de l'aîné (né en 1932) présente des stries angioïdes typiques (arbre généalogique, voir Franceschetti et coll., Les hérédito-dégénérescences chorio-rétiniennes. Rapp. Soc. franc. d'opht. Masson, Paris 1963, p. 552).

Il s'agit probablement d'une hérédité pseudo-dominante, car les parents du jeune malade sont consanguins.

La combinaison de pseudo-xanthome et de dégénérescence chorio-rétinienne pseudo-inflammatoire du pôle postérieur de l'œil, qui peut être considérée comme un équivalent des stries angioïdes, ne se trouve pas mentionnée dans les manuels de dermatologie.

Fig. 1. Dégénérescence chorio-rétinienne pseudo-inflammatoire du pôle postérieur (type Sorsby) dans un cas de pseudo-xanthome de la peau (St. J., 1891; O. G.).
Franceschetti et Thier, Graefes Arch. Ophth. 162: 635 (1961).