II. Démonstrations – Demonstrationen

G.		Ade-Damilano
W.		Jadassohn
R.		Paillard

Genève

Pemphigus familial bénin chronique (maladie de Hailey-Hailey)

G. Adèle, 1899, N° S. 32 462.

L'affection dure depuis 20 ans (aisselle, cou, face interne des cuisses) avec des hauts et des bas; souvent la malade ne peut pas faire son ménage et doit être hospitalisée. Pas d'autres cas dans la famille.

Histologie typique: acantholyse (Fig. 3).

Le traitement (antibiotiques, corticostéroïdes per os et localement, injections de triamcinolone sous les lésions) n'a donné que des améliorations passagères.

* voir Maggiora, A.; Paillard, R. et Jadassohn, W.: Dermatologica 125: 174-183 (1962).

152

Demonstrations – Demonstrationen

Fig. 3. Biopsie, cou, 5. 12. 1957. Pemphigus familial bénin chronique (maladie de Hailey-Hailey).

Depuis un mois, la malade s'est traitée avec de la crème Drenison (Flurandrenolone 0,05 %) sous plastique (méthode Caro, Sulzberger et Witten: Thin pliable plastic films in topical dermatologic therapy. Arch Derm., Chicago 84: 1027, 1961). Lors de la dernière consultation, grande amélioration.

Gr. Frieda, 1907, Priv. 1962.

Une autre malade présentée en 1949 (*Dermatologica* 100: 326, 1950), souffrant de maladie de Hailey-Hailey (aisselle, nuque, région vulvaire) depuis 1929 environ, est toujours en traitement. L'affection évoluant avec des hauts et des bas tend à s'aggraver et rend la patiente invalide pendant de longues périodes. La malade a été soulagée, mais passagèrement seulement, par des pansements sous plastique.

W. JADASSOHN, R. PAILLARD, N. HUNZIKER, H. LOZERON et A. MAGGIORA

Pigmentation du palais chez une malade traitée à la Nivaquine. Coloration des ongles.

J. Lydia, 1919, N° P. 1514/54.

La malade a été traitée pour un lupus érythémateux discoïde typique en 1954-55 avec 192 comprimés de Nivaquine (0,1). En août 1961, rechute; n'avait pas pris