II. Demonstrationen – Démonstrations

H.		Willi
W.		Burckhardt

Zürich

Incontinentia pigmenti Bloch-Sulzberger

1941 publizierten wir einen Fall von Dermatitis herpetiformis Duhring bei einem neugeborenen Mädchen. Gleich nach der Geburt am 12. 2. 1940 bestand ein blasiger Ausschlag an Stamm und Extremitäten. Er heilte in den ersten Lebensmonaten ab und hinterließ eine deutliche z. T. strichförmig und spritzerförmig angeordnete Pigmentierung. Auffallend waren auch vereinzelte verrucöse Effloreszenzen an den Händen, den Füßen und den Beugeseiten der Beine, welche im Lauf der Abheilung des Exanthems sich ausbildeten und nach einigen Monaten vollständig verschwanden. Während der Zeit der entzündlichen Hauteruption zeigte das Blut neben einer Leukozytose bis auf 32 000 eine Eosinophilie von bis zu 46% im Blut und von 25,8% im Knochenmarkausstrich. Das Kind wurde von Zeit zu Zeit nachkontrolliert. Der Hautstatus normalisierte sich langsam. Heute, nach 15 Jahren, sind nur noch vereinzelte verwaschene hellbraune Pigmentflecken in der linken Leistengegend festzustellen. Das histologische Bild solcher Pigmentflecke, welches 1952 erhoben wurde, zeigte unter einer normalen Epidermis im Papillarkörper und in der subkutanen Schicht ein kontinuierliches Lager von stark pigmentierten Chromatophoren.

Als interessanter Befund ist bei dem heute 15jährigen Mädchen eine multiple Nichtanlage von Zähnen zu erwähnen. Es fehlen die Anlagen von sämtlichen 4 Weisheitszähnen, die 4 zweiten Molaren, der erste Praemolar oben rechts, beide Praemolaren oben links, der zweite Praemolar unten links und der seitliche Schneidezahn oben rechts. Die durchgebrochenen Eckzähne haben eine schlanke Kronenform.

Eine solche Nichtanlage von Zähnen ist selten. Sie kann nach der Ansicht des Orthodonten R. Hotz, der so liebenswürdig war, den Zahnstatus aufzunehmen, auf Vererbung beruhen oder durch eine Schädigung des Embryos in den ersten Schwangerschaftsmonaten zustandekommen. Da die Eltern des Kindes normale Zähne haben, steht die zweite Möglichkeit im Vordergrund. Das spätere Entwicklungsbild des Kindes mit den kalkspritzerartig verteilten Pigmentierungen, welche im histologischen Bild aus Chromatophoren bestehen, stimmt mit dem Krankheitsbilde der Incontinentia pigmenti Bloch-Sulzberger überein. In jüngeren Jahren ist von verschiedenen Autoren darauf aufmerksam gemacht worden, daß diese Sulzberger-Bloch'sche Krankheit sehr oft mit einem

562

Demonstrationen – Demonstrations

herpetiformisähnlichen Ausschlag, der kurz nach der Geburt auftritt, beginnt. Stephan Epstein hat darauf hingewiesen, daß unser Fall, den wir unter dem Namen Dermatitis herpetiformis publiziert hatten, in dieses Krankheitsbild hineingeht. Eine Revision der Akten gibt dieser

Vermutung von Epstein recht. Unser Fall gehört zu den relativ seltenen Fällen dieses Syndroms, bei dem durch die gleichen Autoren sowohl das Dermatitis herpetiformis-ähnliche Frühstadium, das aus Pigmentierungen und verrucösen Effloreszenzen bestehende Zwischenstadium und die langsam abnehmenden, früher als Incontinentia pigmenti nach Sulzberger bezeichneten Erscheinungen des Spätstadiums beobachtet werden konnte. Die spontane Abheilung ohne späteres Rezidiv unterscheidet die Affektion von der nie ausheilenden Dühring'schen Dermatose. Interessant sind die Zahnveränderungen, welche auf die Möglichkeit einer frühen embryonalen Erkrankung hinweisen. Ware es nicht möglich, daß diese Dermatitis herpetiformis-ähnliche Krankheit, welche später in eine langsam abnehmende Pigmentierung übergeht, eine Viruskrankheit wäre, welche zuerst diese Zahnanomalien, gelegentlich Defekte an den Augen, Intelligenzdefekte und regelmäßig ein Exanthem verursacht, das manchmal in utero, manchmal in den ersten Lebenswochen abläuft. Beim Ablauf des Exanthems im utero sind die Pigmentveränderungen schon bei der Geburt vorhanden. Sehr merkwürdig ist die Gebundenheit der Krankheit an das weibliche Geschlecht. Das vermutete Virus kann sich offenbar nur an weiblichen Individuen auswirken. Eine Viruskrankheit, die von der Mutter auf das Kind übergeht als Ursache der hier besprochenen Krankheit vermuten auch Uebel, H. Ludvig und G. Korting sowie H. Haber. Der etwas unglückliche Name der Krankheit Incontinentia pigmenti, der nur einen kleinen, zufällig zuerst entdeckten und zudem noch uncharakteristischen Teil des Krankheitsbudes beschreibt, wird wohl kaum mehr auszurotten sein, obwohl man heute das ganze Krankheitsbild, das aus intrauterin entstandenen Mißbildungen, einem herpetiformen Ausschlag bei der Geburt und einem aus Pigmentierungen bestehenden Spätstadium besteht, als eine Einheit erkannt hat.

Literaturverzeichnis

Epstein, St., J. S. Vedder and H. Pinkus: A. M. A. Arch. Derm. Syph. 65, 557, 1952. -Haber, H.: Brit. J. Derm. 64, 129, 1952. – Uebel, H., H. Ludwig und A. Korting: Arch. Derm. Syph. 190, 114, 1950. – Willí, H., und W. Burckhardt: Kinderärztl. Praxis 12, 144, 1941.

P.D. Dr. H. STORCK (Zurich):

1. Syndrom von Peutz-Touraine-Jeghers

(Gemeinsame Beobachtung mit Prof. Dr. P. Rossier und Dr. T. Wegmann, Medizinische Poliklinik, Zurich.)

Die 19jährige Inderin, Sulochina S., leidet seit etwa drei Jahren an wechselnden Darmbeschwerden, z. T. mit Krämpfen und Flatulenz, jedoch ohne Blutungen. Ferner zeigt sie zunehmend mehrere Pigmentflecken an Lippen, Wangenschleimhaut,