Dermatologica, 1955;110:348

Résultats cliniques obtenus avec le Réactyl (paraaminobenzoate de magnésie + catalyseur silicofluoré, stimulateur de la cortico-surrénale)

M.		Juon
----	--	------

Lausanne

Adresse de l'auteur: Dr M. Juon, Bel-Air Métropole (Tour), Lausanne (Suisse)

Administré selon la méthode des 3 séries à doses décroissantes (12, 6, 3), par injections intraveineuses quotidiennes, le Réactyl agit par Faction combinée de Facide paraaminobenzoïque et du Mg comme facteur de stimulation des defenses tissulaires; il joue un role important en réglant le taux phosphocalcique et la reserve alcaline et se distingue par son action antiinflammatoire manifeste par stimulation cortico-surrénale. Cliniquement, ces propriétés se vérifient dans le traitement des eczemas et en particulier des eczemas par sensibilisa-tion, des prurigos et urticaires en agissant électivement sur Fétat inflammatoire et Fétat dépressif psychique; enfin la plupart des patients atteints de pigmentations souvent inesthétiques ont bénéficié du traitement par le Réactyl. – Ce traitement corticostimulant interne peut être favorablement complete par Fapplication d'une pommade à Fhydrocortisone.

Par son action cortico-stimulante (Neukomm), la facilité et Fin-nocuité de son administration, n'exposant pas aux risques d'une thérapie par la cortisone ou FACTH, le Réactyl trouve son indication précisément dans les affections relativement bénignes ne justifiant pas Femploi de cortisone et d'ACTH.

(Die Arbeit erscheint in der «Praxis ».)

Ulcères variqueux et Ongaline

P.M. Par M. de BUMAN (Davos-Platz)

(Manuscrit non reçu)