II. Demonstrationen – Démonstrations

N.		Bovet
A.		Vernet
W.		Jadassohn
R.		Paillard

Clinique dermatologique universitaire de Genève (Directeur: Prof. Dr. W. Jadassohn) et collaborateurs

1° Eruption varicelliforme de Kaposi

a) IN. Jean-Claude, 1952, No S. 18 500.

Séjour à la clinique dermatologique en novembre 1952 pour eczéma infantile; test au blanc d'œuf positif. En mars 1953, hospitalisé à la clinique de pédiatrie pour eruption varicelliforme de Kaposi typique: état grave, convulsions, température à 40°. Inoculation à la cornée de lapin: herpes simplex (kératite dendritique [clinique ophtalmologique: Prof. Franceschetti]).

Traitement: Terramycine; blan-chissement de l'éruption en 3 mois. Quelques jours après son licenciement de la clinique de pédiatrie, l'enfant est à nouveau hospitalisé à la clinique dermatologique pour une poussée d'eczéma infantile. Malgré l'absence d'éléments ombiliqués, Clinique dermatologique universitaire de Genève 445

une inoculation à la cornée de lapin montre à nouveau la présence du virus de l'herpes simplex. Soulignons que la recherche du bacille diphtérique a été négative.

b) R. Jean-Marc, 1953, No P. 1537/53.

Aurait eu à l'âge de 2 à 3 mois la croûte de lait. 2 mois plus tard apparaît une eruption varicelliforme de Kaposi typique avec température à 39°, légère spléno-mégalie, état général assez bien conservé. Inoculation à la cornée de lapin: herpes simplex (kératite dendritique [clinique ophtalmologique: Prof. Franceschetti]). Ajoutons que la recherche du bacille diphtérique a été négative. Traitement: terra-mycine. L'enfant a guéri en un mois environ.

A noter que dans ce cas la réaction au blanc d'œuf a été positive, comme dans le cas précédent. P. FAVARGER (Institut de Chimie Physiologique), W. JADAS-SOHN, R. PAILLARD et E. MUSSO:

2° Xanthomes éruptifs et lésion > éruption extraordinaire.

M. Paul, Priv.

Le malade consulte pour un vitiligo très étendu. À l'examen on constate en outre de nombreux xanthomes disséminés sur les deux bras, les plus grands de la dimension d'une tête d'épingle.

Prise de sang: le tube avec le sang coagulé paraît contenir du lait. Le malade buvait 40 aperitifs, 3 à 4 litres de vin et parfois un litre de cognac par jour. Pas de cirrhose certaine mais polynévrite alcoolique. Pas de diabète, pas de syphilis. Traitement: Pernaemon, Benerva forte et réduction importante des boissons alcooliques. Le malade est perdu de vue. Revu après 2 mois. les xanthomes ont disparu. Le tableau montre les résultats des examens du sang (4 h. après le repas

de midi), avant et après traitement, compares avec les chiffres de Schaafet Werner (Arch. f. Derm. 162, 231, 1930)

Schaaf-Werner Cas personnel

Cas Cas avec Avant Après

normaux xanthomatose traitement traitementi ictère

Lipides totaux

Phosphore lipidique mg%

Lécithine

Cholesterol total

Cholesterol libre

Cholesterol ester^{7/8}

Cholesterol esters Cholesterol total

(,(!