XXXV. Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Dermatologie und Venereologie vom 24. und 25. Oktober 1953 in Basel

Dermatologica, 1954;108:445

II. Demonstrationen – Démonstrations

P.		Favarger ^a
W.		Jadas-Sohn ^b
R.		Paillard ^b
E.		Musso ^b

^aInstitute de Chimie Physiologique, ^bGenève

2° Xanthomes éruptifs et lij > émie extraordinaire.

M. Paul, Priv.

Le malade consulte pour un vitiligo très étendu. A l'examen on constate en outre de nombreux xanthomes disséminés sur les deux bras, les plus grands de la dimension d'une tête d'épingle.

Prise de sang: le tube avec le sang coagulé paraît contenir du lait. Le malade buvait 40 aperitifs,

3 à 4 litres de vin et parfois un litre de cognac par jour. Pas de cirrhose certaine mais polynévrite

alcoolique. Pas de diabète, pas de syphilis. Traitement: Pernaemon, Benerva forte et réduction

importante des boissons alcooliques. Le malade est perdu de vue. Revu après 2 mois. les

xanthomes ont disparu. Le tableau montre les résultats des examens du sang (4 h. après le repas

de midi), avant et après traitement, comparés avec les chiffres de Schaafet Werner (Arch. f.

Derm. 162, 231, 1930)

Schaaf-Werner Cas personnel

Cas Cas avec Avant Après

normaux xanthomatose traitement traitement ictère

Lipides totaux

Phosphore lipidique mg%

Lécithine

Cholesterol total

Cholesterol libre

Cholesterol ester%

Cholesterol esters Cholesterol total

(,(!