III. Présentation de Malades – Krankendemonstrationen

R.S.		Mach
G.H..		Fallet
W.		Jadassohn
R.		Paillard

Genève

Acromégalie avec symptômes rappelant l'acanthosis nigricans.

P. Rosa, 1914, No P. 342/49.

Fig. 1 Fig. 2

Aisselle: acromégalie avec symptômes rappelant l'acanthosis nigricans.

L'affection aurait commencée en 1938 par un épaissement des doigts et par

Clinique universitaire de Dermatologie de Genève 281

l'apparition d'hypertrichose. L'affection cutanée des aisselles aurait débuté en 1945, puis en 1946 les signes d'acromégalie.

La malade qui présente une acromégalie importante et typique avec hypertrichose dans de grandes régions, montre aux aisselles et à un degré moindre aux régions génitales des alterations ressemblant à l'acanthosis nigricans: on trouve une exagération des plis et des sillons et de petites tumeurs pédiculées. La pigmentation déjà peu importante en 1949 a encore diminué.

Histologiquement: papillomatose (fig. 1 et 2).

Discussion

Prof. Robert: On voit dans ce cas de nombreux fibromes molluscoïdes. Nous ne pensons pas que ces fibromes, que l'on rencontre fréquemment dans les aisselles au cours de la grossesse fassent partie des lésions typiques de l'acanthosis nigricans.

E. RUTISHAUSER, W. JADASSOHN et R. PAILLARD:

Lymphocytome.

P. Jean, 1896, No P. 862/52.

Présente au front, depuis 4 ans, des papules rouges de la grandeur d'un pois. Histologie typique: nombreux centres germinatifs. Examen general et exarnen du sang: rdp. 10.000.000 d'U. de pénicilline (500.000 U. par jour) n'ont pas eu d'effet, en tout cas pas dans les 5 semaines après l'arrêt du traitement; par contre 15 jours plus tard, regression importante spontanée (?). (Voir les bons résultats de G. E. Bianchi de la Clinique Miescher. Dermatologica 100, p. 270, 1950.) Tests de transpiration à la pilocarpine: rdp.

K. M. WALTHARD, W. JADASSOHN et R. PAILLARD:

Maladie de Recklinghausen combinée avec vitiligo. B. Fritz, 1908, No P. 114/52.

Tests de transpiration à la pilocarpine négatifs au niveau des tumeurs de la peau, positifs au niveau des taches cafe au lait et du vitiligo.

L. MANUILA, W. JADASSOHN et R. PAILLARD:

Gynécomastie avec pigmentation: sclérodémie.

A. Edouard, 1881, No P. 1362/52.

Gynécomastie. Pigmentation, desquamation et infiltration «en forme de soutien-gorge».

Apparition de la pigmentation dès l'enfance. (L'examen histologique fait après le congrès a montre qu'il s'agit d'une sclérodémie.)

J. J. MOZER, W. JADASSOHN et R. PAILLARD:

1° Hémochromatose familiale.

B. Catherine, 1925.

(La malade vient d'entrer à la Clinique Thérapeutique, l'observation est encore incomplete.)

Réglée à l'âge de 16 ans, normalement pendant 2 ans. A l'âge de 18 ans, aménor-rhée brusque en même temps qu'apparaît une pigmentation généralisée de la peau.