Dermatologica. 1952;105:263

II. Demonstrationen – Démonstrations

W.		Burckhardt
----	--	------------

Städtische Poliklinik, Zürich

1. Multiples bowenoides pigmentiertes Ca basocellulare, 45jährige Patientin, welche an 38 Herden von pigmentierten Carcinoma basocellulare vom klinischen bowenoiden Typus leidet. Die Herde befinden sich im bc-haarten Kopf und am Stamm. Sie sind münzen- bis handtellergroß. Abheilung unter Röntgentherapie. Kleine Herde wurden mit einer einmaligen Dosis von 1500 r, 32 KV und 70 KV, größere Herde mehrzeitig 3mal 800 r oder 10mal 450 r mit 70 KV und 100 KV/1 Al. bestrahlt.

2. Lues congenita.

Die 55jährige Mutter leidet an einer progressiven Paralyse. Ihre 5 Töchter und 1 Sohn im Alter von 18 bis 33 Jahren leiden alle an einer angeborenen Syphilis. (Einmal Osteochondritis im dritten Lebensmonat, durch Arsen-Wismutbehandlung geheilt, einmal Tabes, einmal Paralyse, dreimal Lues latens.) Eine der Töchtern mit Lues latens hat zwei Kinder, die bei der Geburt ebenfalls positive Seroreaktionen aufwiesen. Die ungewöhnliche Häufung von Syphilis in einer Familie hätte verhindert werden können, wenn die jeweils behandelnden Ärzte nicht nur den einzelnen Luesfall behandelt hätten.

(Wird nach Vervollständigung des Stammbaumes ausführlich publiziert.)