Dermatologica. 1951;102:315-316

A propos du pronostic du psoriasis

Contrôle de 42 cas

M.		Diedey
----	--	--------

Travail de la Clinique universitaire de dermatologie de Genève (Dir.: Prof. W. Jadassohn)

Le pronostic du psoriasis quoad sanationem n'est pas favorable. On réussit presque toujours à le faire disparaître complètement, du moins par un traitement fait à l'Hôpital. Mais souvent après un temps plus ou moins prolongé apparaissent des rechutes. Celles-ci sont peu importantes chez certains malades, plus importantes chez d'autres. Une guérison complète et définitive est rare, exception faite pour les personnes très âgées (cite d'après J. Jadassohn. Dermatologie Weidmann 1938). Pour nous faire une idée personnelle à ce sujet, nous avons essayé de convoquer des malades traités il y a 15 à 44 ans pour psoriasis à la Clinique et Polyclinique dermatologiques sous la direction des Professeurs Oltramare et Charles Du Bois.

316

Diedey, A propos du pronostic du psoriasis

TABEAU 1

Nombre de cas de psoriasis traités de 1906 à 1935 et contrôlés fin 1949, commencement 1950: 42.

apparition du psoriasis:

il y a au minimum 15 ans

il y a au maximum 65 ans

il y a en moyenne environ 32 ans

au moment du contrôle:

pas de psoriasis 7 cas

psoriasis certain mais sans importance 16 cas

psoriasis assez important 10 cas

psoriasis très important 9 cas

Nous devons encore souligner le fait que ces malades ont été traités par des méthodes très différentes: un traitement intensif à la chrysa-robine n'a été fait que très exceptionnellement.

Parmi les 42 cas de psoriasis vus à la clinique et polyclinique dermatologiques de Genève, il y a 15 à 44 ans, il y en a 35 chez lesquels le diagnostic de psoriasis peut être posé aujourd'hui encore, et il y en a 19 qui ont aujourd'hui un psoriasis assez ou même très important.

Zusammenfassung

Nachkontrolle von 42 Psoriasisfällen, die vor 15-44 Jahren die Klinik aufgesucht hatten. Bei 35 Patienten war die Psoriasis noch nachweisbar.

Summary

Forty-two cases of psoriasis, treated during 15 to 44 years were reexamined. In 35 cases it was still possible to confirm the diagnosis.