Dermatologica. 1950;100:326

II. Démonstrations – Demonstrationen

P.		Schwarz
W.		Jadassohn
R.		Paillard

Bâle

Pemphigus familial bénin chronique (Maladie de Hailey-Hailey).

G. Frieda, 1907. La malade, âgée de 42 ans, a été vue par H. Fuchs, Bale, et W. Lutz, Bale, et par A. Marchionini. Le diagnostic a été fait par Lutz. L'affection a débuté en 1929 ou 1931.

Un très grand nombre de traitements ont été faits jusqu'à maintenant, aucun avec un succès «spectaculaire». Il semble que les lésions récidivent continuellement. Les lésions actuelles de l'aisselle droite existent depuis 20 mois sans discontinuer et semblent correspondre tout à fait à la figure 1 de Nordlind et Blumenthal (Acta dermato-venereologica 29, 341, 1949). Des lésions typiquement bulleuses au cou et des lésions à l'autre aisselle et dans la région vulvaire ont été passagères.

L'histologie est sur quelques coupes typique (Fig. 2). Dans la famille de la malade il ne semble pas y avoir de dermatose analogue.

Fig. 2

Nous aimerions recevoir des propositions thérapeutiques et spécialement savoir ce que pensent les collègues d'une excision totale à l'aisselle avec greffe ultérieure; ce qui serait, d'après H. Kæchlin, techniquement facile. Nous craignons que si nous n'arrivons pas à guérir l'aisselle il se produise une ankylose de l'épaule.