II. Demonstrationen – Démonstrations

J.		Rebmann
----	--	---------

Clinique Dermatologique Universitaire Genève

1° Tabes: Homme de 71 ans qui s'est infecté en 1898 et qui souffre de tabes depuis 1918. Dès lors il a eu 46 cures différentes antisyphilitiques dont la plupart étaient des cures mixtes. Lorsque le malade est entré dans notre Service, il était alité depuis 48

Demonstrationen – Demonstrations

6 mois, ne pouvant plus bouger les jambes activement et il montrait en outre une arthropathie tabétique du coude gauche. Le cas est présenté pour 2 raisons:

parce qu'il s'agit d'une arthropathie tabétique typique, rare à ce degré (fig. 2).

parce qu'après une cure de 10 millions d'unités de ferricilline à raison de 2 piqûres de 200 000 unités par jour (cure très bien supportée) le malade a été grandement amélioré; il marche sans appui, bien entendu d'une marche typiquement tabétique. Les grandes douleurs ont complètement cessé.

2° «Syndromes osso-cutanés»: Homme de 70 ans soigné dans notre Service pour ulcère de la jambe gauche (fig. 3).

Fig. 3a Fig. 3b

Fig. 3a. Déformation osseuse, ossification des ligaments interosseux (en toile d'a-raignée), périostose en neige fondante, périostose en forme de laine, périostose en pâte feuilletée. (Dr. Voluter [Service de Radiologie de l'Université de Geneve, Prof. Gilbert]).

Fig. 3b. Ostéite éburnéissante, périostose, mutilation condylienne en coup de ciseaux. chondromatose. subluxation olécranienne. (Dr. Voluter [Service de Radiologie de l'Université de Geneve, Prof. Gilbert]).