Dermatologica. 1948;97:89

II. Demonstrationen – Démonstrations

F.		Wyss-Chodat
----	--	-------------

Genève

Monsieur B-, 50 ans:

Ulcère à la jambe gauche, en Janvier 1945, à la suite d'une blessure infectée probablement par les germes «du fromage». Aspect de gangrene. Ulcère de 20/20cm. Toutes analyses négatives, y compris glycémie. Divers traitements locaux et généraux, y compris la pénicilline. Guérison par les compresses de Dakin. Greffes épidermiques faites à deux reprises (Reverdin).

Ulcère gangréneux à marche rapide à la jambe droite, à la suite d'un nouveau traumatisme en juillet 1946. Ulcération gagnant les tendons, les os et les capsules articulaires. Analyses négatives. Glycosurie momentanée produite par l'intoxication par des cachets calmants.

Amputation envisagée. Traitements locaux antiseptiques divers. Calmant local: Nestosyl. Deux greffes épidermiques en bonne voie de guérison, mais rechute en février à la suite d'une phlébite. Nouvelle ulcération près du tibia. Compresse de Dakin. (Ne supporte pas l'A.O.) Traitement par la poudre d'aluminium et la pommade au Pellidol et Baume du Pérou. Pénicilline, insuline, vaccin.

Madame G., 49 ans:

Epithéliome spino-cellulaire de l'angle maxillaire gauche, développé sur un lupus vulgaire de longue date.

Epithéliome baso-cellulaire sur le côté gauche du thorax (pour les détails et les photos voir la communication «A propos de la podophyllyne »).