Hämokoagulationsfaktoren bei der Antikonzipation mit Antigest

I.		Mišinger
I.		Krobová
Z.		Heřmanská

II. Universitäts-Frauenklinik der Karls-Universität (Direktor: Prof. Dr. J. Lukáš) und Hämatologisches Zentrallabor des II. Fakultäts-Krankenhauses (Direktor: Dr. M. Suchan), Prag

Bei 30 Frauen vor der Anwendung und bei 20 Frauen während der Anwendung von Antigest wurden einige Gerinnungs- und fibrinolytische Faktoren untersucht. Die Untersuchungen wurden am 22. Tag des Zyklus, in behandelten Zyklen zwischen dem 2. bis 8., zumeist im 3. Zyklus durchgeführt.

Untersucht wurden der Quick-Test, Prothrombin nach Roller, die fraktionierte Konsumption von Prothrombin, Fibrinogen nach Stirland, die Euglobulinfibrinolyse nach Kowarzyk und Buluk sowie die Thrombinzeit. Auf Grund der Untersuchungen ist nicht mit einer verstärkten Neigung zu thromboembolischen Vor-kommissen zu rechnen. Es wird jedoch darauf aufmerksam gemacht.

* Originaltitel: Hemokoagulační faktory při antikoncepci Antigestem.

Mišinger, Krobová und Hermanská

199

macht, daß mit den bisher bekannten Untersuchungsmethoden nicht alle Veränderungen überzeugend erfaßt werden können. Mit Rücksicht auf die klinischen Erfahrungen gilt daher eine durch-gemachte Thrombophlebitis oder Thromboembolie als Kontra-indikation der hormonalen Antikonzipation.

Gynäk. Rdsch. 4: 199 (1967)

Sehstörungen nach Gabe von Antigest*

K. Dvořák und M. Arenberger

Institut für Ärztliche Fortbildung, Frauenklinik (Direktor: Doz. Dr. A. Öernoch) und I.

Universitäts-Augenklinik der Karls-Universität (Direktor: Prof. Dr. E. Dienstbier),

Prag

Sehstörungen zählen zu den seltenen Komplikationen nach der Gabe peroraler Antikonceptiva.

D. Die Autoren berichten ausführlich über drei Fälle von Sehstörungen

die nach der Gabe von Antigest B bei einer Gruppe von 134 Frauen beobachtet wurden. Im

Vordergrund der Symptomatik standen Sehschärfeverlust

Nebelsehen

Augenbrennen

Tränen-fluß

Lichtscheue

Farbringe und gelegentlich Lidödeme. In keinem der drei Fälle konnten bei wiederholten Kontrollen krankhafte Befunde an Auge oder Augenhintergrund erhoben werden. Alle subjektiven Beschwerden die nach unterschiedlich langer Einnahme der Präparate auftraten klangen nach Absetzen der Medikation sehr rasch ab.

* Originaltitel: Poruchy vidění po Antigestu.