Röteln in der Schwangerschaft

R.G.		Katz
L.R.		White
J.L.		Sever

National Institute of Health, Bethesda, MD (USA)

Rötelninfektion der Mutter in der Frühschwangerschaft bewirkt in den meisten Fällen Keimschädigung des Kindes. Man schätzt, dass durch die Rötelnepidemie 1964 in den USA 20 000 geschädigte Kinder auf die Welt kamen. Die Krankheit hat einen Höhepunkt im Frühling. Die Infektion erfolgt durch Kontakt- und Tröpfcheninfektion, die Übertragungszeit ist eine Woche vor bis eine Woche nach dem Auftreten des Exanthems anzunehmen. Die Erkrankung hinterlässt lebenslängliche Immunität. Klinisch ist die Lymphadenitis, vor allem im Retroaurikular-Okzipitalbereich typischer als das Exanthem. Die weiteren Krankheitssymptome sind uncharakteristisch. Die Inkubationszeit beträgt 2-3 Wochen. Die Antikörper sind mit verschiedenen serologischen Verfahren nachweisbar, wobei die mit Komplementbindungsreaktion nachweisbaren am spätesten auftreten.

Erkrankt eine Schwangere im ersten Trimenon an Röteln, so besteht eine Chance von 20 %, dass das Kind geschädigt zur Welt gebracht wird. In den ersten Schwangerschaftswochen ist die Gefahr besonders gross, sie beträgt 35 % Risiko. Es kann jedoch nur ein relativ geringer Prozentsatz gefährdeter Schwangerer befallen werden, da über 85 % der Erwachsenen Antikörper aufweisen. Allerdings ist die durchgemachte Erkrankung anamnestic nur selten exakt zu erheben.

1 Originaltitel: Maternal and congenital rubella.

Röteln in der Schwangerschaft

259

Das Syndrom der angeborenen Rötelerkrankung erfasst Schwerhörigkeit, Katarakte, Chorioretinitis und Mikrophthalmie, Herzfehler, geistige und motorische Verlangsamung, verspätete Zahnbildung und hypoplastischen Schmelz. Auf Grund der Erfahrungen von 1964 wurden zum «erweiterten Rötelsyndrom» folgende Zeichen hinzugefügt: niedriges Geburtsgewicht am Termin, enzephalitisähnliche Bilder, Hepatosplenomegalie, persistierende Thrombozytopenie mit petechialen Blutungen oder Purpura, interstitielle Pneumonie, Röntgenaufhellungen der langen Röhrenknochen, Anämie, Lymphozytopenie, Myokardschäden sowie Glaukom und Irishypoplasie.

Der Virus kann im allgemeinen von den Neugeborenen isoliert werden, es sind auch Fälle chronischer kongenitaler Rötelninfektion mit Virusnachweis ohne Missbildungen bekannt. Die Art der teratogenen Wirkung ist noch unbekannt.

Auch prophylaktisch ist bei gefährdeten Schwangeren die Impfung mit Immunglobulin vorzuschlagen. Die Antikörpertiter im Serum werden durch die Impfung nicht beeinflusst, so dass serologische Schlüsse auf eine eben durchgemachte Erkrankung ungehindert gezogen werden können.

nen. Impfstoffe mit abgeschwächtem Lebendvirus sind in Entwicklung, jedoch noch nicht handelsreif. Müssen Schwangere geimpft werden, so ist der ebenfalls in Entwicklung befindliche Impfstoff aus abgetötetem Virus empfehlenswert, der jedoch keine lebenslängliche Immunität hinterlässt.

Die absichtliche Exposition der weiblichen Jugend vor dem fortpflanzungsfähigen Alter ist abzulehnen, da auf diesem Wege der Virus ungewollt auf Schwangere übertragen werden kann. H. Stöger

Aus: Zbl. Bakt. ParasitKde 208: 122-135 (1968); cit. Gynäk. Rdsch. 7: 259-260 (1969)

Die latente Toxoplasma-Infektion des Uterus und ihre Bedeutung für die Schwangerschaft

H. Werner und I. Egger Robert Koch-Institut, Berlin

Über die Bedeutung der latenten Toxoplasma-Infektion der Mutter bestehen grundsätzlich zwei verschiedene Meinungen. Ein Teil der Autoren