Spontane Uterusruptur in der ersten Schwangerschaftshälfte

H.N.	Hoang Ngoc	Minh
N.T.	Nguyen Thi	Long
N.T.	Ngo Thanh	Que

Die Autoren berichten über 2 Fälle von spontaner Uterusruptur in der ersten Schwangerschaftshälfte. Dieses äusserst seltene Ereignis soll nicht mit der Ruptur des einen Uterushornes verwechselt werden im Falle einer ganz nahe am Ostium tubae liegenden interstitiellen Tubargravidität mit sekundärer Einwucherung des Trophoblasten in den Funduswinkel. In beiden Fällen handelt es sich um Mehrgebärende im 5. bzw. 3. Schwangerschaftsmonat. Beide Male bestand das klinische Bild eines subakuten Abdomens mit den Zeichen einer inneren Blutung, und die Laparotomie zeigte eine Rupturstelle am Fundus uteri, wobei die Uteruswand in diesem Bereich auffallend dünn war.

Anhand dieser Fälle und der aus der Literatur zusammengestellten Angaben lassen sich folgende Rückschlüsse ziehen. Die Diagnose basiert auf dem Syndrom eines mehr oder auch weniger akuten Ereignisses nach einer bisher komplikationslosen Gravidität. Die Uterusgrösse entspricht der Dauer der Amenorrhoe, es lässt sich aber kein Adnex- oder Douglas-tumor feststellen.

Anamnestisch sind Multiparität, Kürettagen, pathologisches Wochenbett hervorzuheben. Die falsche Annahme einer rupturierenden Extrauterin-gravidität wird meistens erst bei der Laparotomie – intakte Tuben – revidiert. Die Rupturstelle sitzt meistens am Fundus. Die pathologisch-histologische Untersuchung zeigt folgende Merkmale: abnorm dünne Uteruswand in der Umgebung der Rupturstelle mit sehr mangelhaft ausgebildeter Dezidua, tiefes Eindringen der Chorionzotten bis ins Myometrium, beginnende Degeneration der Myometriumfasern.

Abgesehen von Missbildungen kommen ursächlich in Frage: frühere gynäkologische Erkrankungen

Traumata und Multiparität. Die Autoren betonen in dieser Hinsicht die Gefahr der Kürettage post partum oder post abortum sowie die manuelle Plazentalösung. Bei diesem immer pathologisch veränderten Uterus ist kein konservatives Vorgehen mehr am Platz

sondern eine totale Hysterektomie angezeigt. P. Crevoisier

1 Originaltitel: Rupture spontanée de l'utérus gravis pendant la première moitié de la gestation.