Gynäk. Rdsch. 1974;14(Suppl. 1):44

Croissance du diamètre bipariétal fœtal en fonction de différents paramètres maternels

J.M.		Cruz
H.		Bossart

Clinique universitaire de Gynécologie et d'Obstétrique (Directeur: Prof. W. R. Merz),
Lausanne

Adresse de l'auteur: Dr. J. M. Cruz, Clinique universitaire de Gynécologie et d'Obstétrique de Lausanne, CH-1000
Lausanne (Suisse)

Un collectif forme de suissesses et d'étrangères prises au hasard ont été suivies dans le Département des Ultrasons de la Maternité de Lausanne, aim de voir si leur mode de vie et leurs conditions socio-économiques si différents pouvaient avoir une quelconque repercussion sur la croissance du diamètre bipariétal.

113 patientes ont été retenues après une severe selection. 961 mesures du diamètre bipariétal dès la 20e semaine jusqu'à l'accouchement

ont été pra-tiquées. Des courbes du diamètre bipariétal

avec différents groupes de patientes

de nationalité et de parité différentes

ont été élaborées. A notre grande satisfaction

nous n'avons pas mis en evidence de difference de croissance du diamètre bipariétal dans tous

les groupes étudiés. A signaler qu'une publication de cette etude aura lieu dans le cadre du Fonds national.