Einführung

H.A.

Hirsch

Tübingen

Für das erste Fortbildungssymposium, das die Firma Braun-Dexon für Gynäkologen veranstaltet hat, haben wir das Thema „Die vaginale Hysterektomie und Inkontinenzoperationen“ gewählt. Die vaginale Hysterektomie ist ein Kernstück der operativen Tätigkeit des Gynäkologen, ja man könnte sie als die typische gynäkologische Operation schlechthin bezeichnen: Sie wird nur von Gynäkologen ausgeführt, von keinem anderen Fachgebiet beansprucht, und ihre Berechtigung ist unbestritten.

Obwohl die derzeit tätige Gynäkologengeneration die vaginale Hysterektomie und Kolporrhaphie in ihrer Ausbildung gelernt hat und sie beherrscht, so gibt es doch Aspekte, die erst in den letzten Jahren so recht bekanntgeworden sind und somit in der Praxis noch nicht überall Eingang gefunden haben.

Dazu gehören unter anderem die hohe Peritonealisierung, die stärkere Beachtung der Anatomie bei der Kolporrhaphie (Diaphragma-Plastik, Levator-Plastik) und die stärkere Berücksichtigung der Pathophysiologie bei der Indikationsstellung für Inkontinenzoperationen.

Man weiss heute, dass eine Harninkontinenz infolge einer sensiblen oder motorischen Reizblase durch herkömmliche Inkontinenzoperationen nicht zu beheben ist. Diese Formen lassen sich durch eine präoperative urodynamische Untersuchung erkennen. Auf die Problematik der Mischformen sei nur hingewiesen. Für ihre Behandlung gibt es noch kein befriedigendes Konzept. Über die partielle Denervierung der Harnblase bei desperaten Fällen von Detrusor-dyssynergie sind die Erfahrungen noch begrenzt.

Andererseits setzt sich die Meinung immer mehr durch, dass zur Behebung der Belastungsinkontinenz suprapubische Suspensionsoperationen effektiver sind als die vaginale Plastik. Damit wird die Priorität des vaginalen Vorgehens, die lange Zeit unbestritten gait, in Frage gestellt.

Hirsch

2

In mehreren Studien hat sich gezeigt, dass Komplikationen nach vaginaler Hysterektomie im Vergleich zu denen nach abdominaler Hysterektomie nicht geringer sind. Schwere pelvine Infektionen bei prämenopausalen Frauen scheinen nach vaginaler Hysterektomie häufiger aufzutreten als nach abdominaler.

Aus den genannten Gründen ist es verständlich, dass die vaginale Hysterektomie auch von „vaginal eingestellten“ Operateuren heute kritischer gesehen und nicht mehr in demselben Masse bevorzugt wird wie noch vor einigen Jahren. Die Tatsache, dass es technisch möglich ist, einen Uterus vaginal zu entfernen, indiziert meines Erachtens noch nicht das vaginale Vorgehen. Die Meinungen zu diesen Fragen sind jedoch keineswegs einheitlich, wie auch aus den Vorträgen und Diskussionen des Symposiums hervorgeht.

Ebenfalls zu den kontroversen Themen gehört die routinemässige Entfernung der Adnexe bei der Hysterektomie ab einem bestimmten Lebensalter. Vaginal wird dieser Eingriff seltener ausgeführt als abdominal, obwohl für einen geübten Operateur die vaginale Adnexektomie – mit wenigen Ausnahmen -ebensogut möglich und ebenso sicher ist wie die abdominale.

Hysterektomie wie Inkontinenzoperationen gehen zwangsläufig mit einer beträchtlichen Anzahl von Komplikationen einher. Diese Tatsache als selbstverständlich zu akzeptieren, schliesst nicht aus, dass man mit allen Mitteln versucht, die Komplikationsrate so weit wie möglich zu senken.

Dazu ist die Kenntnis der eigenen Komplikationen durch eine routinemässige Erfassung ebenso notwendig wie die Kenntnis der Möglichkeiten zu ihrer Verhütung und Behandlung.

Das sind einige der Fragen, die im Symposium „Die vaginale Hysterektomie und Inkontinenzoperationen“ in Vorträgen und Filmen dargestellt und in einer ausgedehnten Diskussion kommentiert wurden.

Aus Raumgründen ist es leider nicht möglich, die vielen interessanten Diskussionsbeiträge in diesem Heft wiederzugeben; sie werden freundlicherweise von der Firma Braun-Dexon als Hektographie zur Verfügung gestellt und können dort angefordert werden.