Betamethasontest zur Diagnose der Plazentainsuffizienz

F.		Friedrich
G.		Bernaschek
Ch.		Bieglmayer

II. Universitäts-Frauenklinik Wien (Vorstand: Prof. H. Janisch), Wien

Dr. F. Friedrich, II. Universitäts-Frauenklinik Wien, Spitalgasse 23, A-1090 Wien (Österreich)

Die Verabreichung von Glukokortikoiden während der Schwangerschaft zur Förderung der fetalen Lungenreife führt zu einem Östriolabfall im Blut der Schwangeren, der bei Patientinnen mit Plazentainsuffizienz starker ausgeprägt ist [1]. Daher wurde untersucht, inwieweit mit einer gegenüber der therapeutischen Dosis deutlich verminderten Gabe von Betamethason die fetoplazentare Funktion getestet werden kann.

Bei 21 Schwangeren wurden zwischen der 30. und 40. Schwangerschaftswoche 4 mg Betamethason intravenös verabreicht. Um 8.30 Uhr, unmittelbar vor der Betamethason-injektion, dann um 12.00 Uhr, 16.00 Uhr, 20.00 Uhr und 8.30 Uhr am folgenden Tag wurden Blutproben abgenommen. Aus den Serumproben wurden unkonjugiertes Östriol (E3), Kortisol, Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) sowie Plazentolaktogen radioimmunologisch bestimmt. Das Patientengut wurde in drei Diagnosegruppen zusammengefasst: Schwangere mit schwerer Plazentainsuffizienz, definiert durch eine Wachstumsretardation des Feten von mehr als 2 Wochen (Gruppe I, n = 6), normale Schwangerschaften (Gruppe II, n = 8) und Schwangerschaften mit einer fetalen Wachstumsretardation von 2 Wochen (Gruppe III, n = 7). Bezüglich des durchschnittlichen Testzeitpunktes unterschied sich diese Gruppe nicht von der Gruppe I, während in der Gruppe II der Test im Durchschnitt später durchgeführt wurde, weil Frauen mit normalem Schwangerschaftsverlauf erst nahe dem Termin stationär aufgenommen werden.

Bei keiner der untersuchten Gruppen änderten sich die Werte für Plazentolaktogen signifikant während der Durchführung des Betamethasontests. Die Serumkonzentrationen von E3, Kortisol und DHEA-S vor und nach Betamethasongabe sind in der Abbildung 1 dargestellt. Bei allen Gruppen wurde 8–12 h nach Betamethasoninjektion eine maximale Supprimierung dieser Hormonparameter festgestellt, welche bei der Plazentainsuffizienzgruppe über einen Zeitraum von 24 h bestehen blieb. In der Normalgruppe stiegen die E3-Werte am nächsten Tag wieder zu Ausgangswerten an, dieser Wiederanstieg war in der Gruppe III weniger ausgeprägt.

Nach Simmer et al. [2] stammen DHEA-S und Kortisol überwiegend aus der mütterlichen Nebennierenrinde und sollten daher zum Nachweis deren Suppression durch das Betamethason dienen. Bei Plazentainsuffizienz fanden wir insbesondere für Kortisol erniedrigte Ausgangswerte und eine länger andauernde Suppression der Serumwerte im Vergleich zu den anderen Gruppen, was auf eine unterschiedliche Nebennierenfunktion der Mutter hinweisen könnte. Distler et al. [3] haben bei einem ähnlichen Test keine signifikant unterschiedlichen Kurvenverläufe der Nebennierenparameter gefunden, allerdings haben diese Autoren ein Normalkollektiv mit einer allgemeinen Risikoschwangerschaftsgruppe verglichen.

Abb. 1. Anteile im Serum von E3, DHEA-S und Kortisol vor und nach intravenöser Gabe (Pfeil) von Betamethason (4 mg). Mittelwerte $\pm$ SEM. · = Normalgruppe; ▲ = leichte Wachstumsretardation; o = Plazentainsuffizienz.

Der unterschiedliche Kurvenverlauf für E3 und der fehlende Wiederanstieg 24 h nach Gabe von Betamethason in der Gruppe mit Plazentainsuffizienz kann durch eine stärkere und länger andauernde Suppression der infolge der Wachstumsretardation und des «fetal distress* am Rande des Erschöpfungszustandes arbeitenden fetalen Nebennierenrinden erklärt werden. Ausserdem dürfte die Umwandlung von 16-OH-DHEA-S in E3 in der insuffizienten Plazenta langsamer erfolgen [4].

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass der Betamethasontest mit drei Blutentnahmen in Abständen von je 12 h bei Verdacht auf fetoplazentare Insuffizienz eine Unterscheidung von Fällen mit konstitutionell kleinen Feten und deshalb emiedrigten E3-Werten und von Fällen mit falscher Terminberechnung, die im Test normal reagieren, ermöglicht.

Literatur

- Friedrich, F.; Bernaschek, G.; Biegelmayer, Ch.: Serumöstriolspiegel nach Betamethasongabe zur Förderung der Lungenreife. *Pad. Pädol.* 17: 301 (1982).
- Simmer, H.H.; Tulchinsky, D.; Gold, E.M.; Frankland, M.; Greipel, M.; Gold, A.S.: On the regulation of estrogen production by cortisol and ACTH in human pregnancy at term. *Am. J. Obstet. Gynec.* 119: 283 (1974).
- Distler, W.; Kiwit, J.; Potthoff, S.; Morgenstern, J.; Albrecht, H.: Der Östriolreaktionstest zur dynamischen Testung der fetoplazentaren Einheit bei normalen und pathologischen Schwangerschaften im 3. Trimenon. *Arch. Gynaek.* 232: 457 (1981).
- Lauritzen, Ch.: Untersuchungen über die physiopathologischen Grundlagen des DHEA-Belastungstests bei normaler und bedrohter Gravidität. *Arch. Gynaek.* 214: