Gehen in der Eröffnungsperiode

Erste Ergebnisse einer randomisierten Vergleichsstudie

H.	Heidi	Genger
P.		Sevelde
H.		Salzer

I. Universitäts-Frauenklinik (Vorstand: Prof. Dr. E. Gitsch)

Anschrift des Verfassers: Dr. Heidi Genger, I. Universitäts-Frauenklinik, Spitalgasse 23, A-1090 Wien

Es wird über erste Erfahrungen mit einem Telemetriegerät berichtet [1], welches es ermöglichte, in einer prospektiv randomisierten Studie zu untersuchen, ob das Gehen unter der Eröffnungsperiode Vorteile bringt. Bei jeder 2. Schwangeren wurde eine normale Geburt angestrebt, d. h. ab dem Zeitpunkt der Blasensprengung mußte die Patientin im Bett bleiben. Sie wurde mittels üblichem Kardiotokogramm überwacht. Die jeweils andere Patientin durfte sich auch nach der Blasensprengung frei bewegen und im Kreißsaal umhergehen. Für die sichere und stetige Überwachung auch dieser Patientinnen wurde das Telemetriegerät eingesetzt, welches auf dem Prinzip eines Funkgerätes basiert. Eine Skalp-elektrode wird am kindlichen Schädel angebracht und an das Funkgerät, welches die Patientin mittels Gurt bei sich trägt, angeschlossen. Das Empfangsgerät mit Antenne steht mit einem Kardiotokographen neuerer Bauart in Verbindung, der wie bei den üblichen Geräten ein akustisches und ein digitales Signal gibt. Die Dokumentation der kindlichen Herzschläge erfolgt über den herkömmlichen Schreiber. In der Qualität der aufgezeichneten Kurven besteht kein Unterschied, lediglich eine Wehenschreibung im üblichen Sinn ist nicht darstellbar. Die Patientinnen können allerdings über einen Druckknopf angeben, wann sie eine Wehe verspüren. Dieses Signal wird als Strich auf dem Kardiotokogramm sichtbar.

In der prospektiv randomisiert angelegten Studie wurde überprüft, ob geburtshilfliche Parameter durch das Gehen beeinflusst werden können. 41 Patientinnen (22 gehende und 19 liegende) wurden bisher randomisiert. Voraussetzung war, daß es sich um Erstgebärende handelte, daß der Muttermund 3 cm geöffnet war und daß der Wehenbeginn spontan, d. h. ohne medikamentöse Einleitung eingetreten war.

Tabelle I zeigt die in ihren Voraussetzungen durchaus vergleichbaren Kollektive.

Die Patientinnen der Telemetriegruppe verbrachten im Durchschnitt noch 2 Stunden ambulant, was im Schnitt einer Muttermundsweite von 7 cm entsprach. Lediglich eine Patientin empfand es als angenehm, bis zum völligen Verstreichen des Muttermundes zu

Tabelle I. Gruppe A Gruppe B

(gehen n = 22) (liegen n = 19)

Alter der Patientin	26,0 ± 5,7	24,3 ± 4,3
Gewicht der Patientin	59,7 ± 9,8	n. s. 58,4 ± 8, Ü
Schwangerschaftsdauer	39,6 ± 1,2	39,4 ± 1,3
Geburtsgewicht der Kinder	3400 ± 340	3094 ± 547

Freie Vorträge

Tabelle II. Gruppe A Gruppe B

(gehen n = 22) (liegen n = 19)

Geburtsdauer	7,4+3,9	7,2+5,8	Medikamentenbedarf
mehr als 1 Alodan®	1	1	
Spasmolytikum	17	8	
Spasmolytika	1	1 keine Analgesie	10 8 Syntocinonperfusor 7 n. s. 2
Forzeps	1	0	
Sektio	0	1	
Apgar < 8	3	3	

gehen. Eine Patientin lehnte die Telemetrie ab, eine andere legte sich bereits nach 10 Minuten wieder ins Bett. Die Ergebnisse zeigt Tabelle II.

Als wichtigster Parameter für die Studie erschien die Frage nach der Geburtsdauer. Sie unterscheidet sich in beiden Gruppen nur unwesentlich. Bei dem Medikamentenbedarf fällt auf, daß die Patientinnen der Telemetriegruppe nach dem Hinlegen wegen einer sekundären Wehenschwäche häufiger einen Syntocinonperfusor benötigten. Bei den geburtshilflich beendigenden Operationen und dem Apgar fand sich kein signifikanter Unterschied.

Unter Berücksichtigung der noch kleinen Fallzahl läßt sich zusammenfassend sagen, daß die Mobilisierung in der Eröffnungsphase keinen nachweislichen Vorteil in medizinischer bzw. geburtsmechanischer Sicht bringt. Hingegen fand die Gruppe um Radmann [2], daß das Aufstehen bei Frauen mit verzögertem Geburtsfortschritt sehr wohl den Geburtsvorgang beschleunigt.

Da sich in dieser Studie keine Nachteile ergaben, kann man derzeit den Patientinnen -sozusagen als Serviceleistung – anbieten, je nach Bedürfnis nach der Blasensprengung aufzustehen und sich in der Entbindungsstation frei zu bewegen. Die Frage, wie weit sich die längere Bewegungsfreiheit psychisch, d. h. positiv auf das Geburtserlebnis auswirkt [3], wird noch in einer weiteren Studie untersucht; erste Erfahrungen ergeben einen durchaus positiven Eindruck.

Literatur

Wernicke, K. et al.: Stellenwert der Telemetrie, 10. dt. Kongress f. perinatale Medizin, Berlin, Thieme. Stuttgart 1982, Hrsg. J. W. Dudenhausen u. E. Saling. pp. 52–54.

Radmann, Dietlind et al.: Geburtsfortschritt und Kardiotokographische Parameter bei Mobilisation unter der Geburt. Zbl. Gynäk. 105 (1983) 900–906.

Mendez-Bauer: The dynamics in labor in different positions. 7th European Congress of perinatal Medicine, Barcelona, Spain 1980.