Sonographische Diagnostik der Extrauterin gravidität

L.		Schausberger
E.		Golob

Geburtshilflich-gynäkologische Abteilung des LKH-Steyr (Vorstand: Prim. Prof. Dr. E. Golob)

Dr. L. Schausberger, Geb.-gynäkol. Abt. LKH Steyr, Sierningerstraße 170, A-4400 Steyr

Aufgrund der technischen Verbesserung der Ultraschallgeräte in der Medizin kommt der Sonographie bei der Früherkennung der Extrauterin gravidität immer mehr Bedeutung zu. Dennoch gibt es die Diskussion zwischen nahezu irrtumsfreien Befunden und solchen mit sehr beschränkter klinischer Aussagekraft. Ein hundertprozentiger sonographischer Nachweis einer ektopen Schwangerschaft gelingt nur bei eindeutiger Darstellung eines außerhalb des Uterus gelegenen Fruchtsackes mit vitalem Embryo. Trotz des unterschiedlichen zeitlichen Ablaufes der ektopen Gravidität und sehr verschiedenartigen anatomischen Verhältnisse, lassen sich gewisse krankheitsspezifische Merkmale in der Sonographie herausarbeiten.

In der Literatur werden vier typische sonographische Kriterien angeführt:

- der vergrößerte Uterus ohne Fruchthöhle
- das progesteronstimulierte Endometrium
- die retrouterine Hämatocele
- der Adnexbefund

Untersuchung von 82 EU im Zeitraum von 1983-1985 an der geburtshilflich-gynäkologischen Abteilung des LKH-Steyr. Bei 56 Fällen wurde neben der klinischen Diagnostik eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt. Die Untersuchungen wurden mit Linearscanner mit einer 3,5-MHz-Sonde und von verschiedenen Personen erhoben.

Tabelle I zeigt die Zusammenfassung unserer Ergebnisse: Von 56 präoperativ sonographisch ausgewerteten EU boten 52 (93%) eines der oben angeführten Kriterien. Bei 3 Fällen gelang der direkte Nachweis der kindlichen Herzaktion. Unter Berücksichtigung der vorhin angeführten sonographischen Kriterien, fand sich am häufigsten ein Adnexbefund in 35 von 56 Fällen. Eine retrouterine Flüssigkeitsansammlung stellte sich in 23 Fällen, ein leerer Uterus in 27 Untersuchungen dar. Die deciduale Endometriumstruktur konnte in 12 Fällen beobachtet werden, 3mal fand sich eine positive kindliche Herzaktion.

Tabelle I. Sonographische Befunde

Uterus ohne Fruchthöhle 27/56 (48%)

deciduales Endometrium 12/56 (21%)

Douglascele 23/56 (41%)

Adnexbefund 35/56 (62%)

Intakte EU 3/56 (5%)

Freie Vorträge (Gynäkologie)

Alle 4 Kriterien boten sich bei keiner Untersuchung, ein Symptom konnte bei 19 Frauen nachgewiesen werden, 2 bei 27 und 3 bei 6 Fällen.

Die Adnexbefunde wiesen ein außerordentlich breites sonographisches Bild auf. Es boten sich kleine cystische Areale bis hin zum 6-8 cm messenden cystisch soliden Tumor mit darstellbarem Fruchtsack und Fruchtschatten mit positiver kindlicher Herzaktion. Bei 2 Fällen wurde im leeren Uterus ein normal liegendes IUP dargestellt.

Das progesteronstimulierte Endometrium konnte in 6 Fällen dem Endometriumtyp 6 nach Bald zugeordnet werden, 6mal fand sich intrauterin ein pseudofruchtsackähnliches Gebilde. Bei der Beurteilung des Douglaschen Raumes konnte 20mal ein Flüssigkeitsspiegel, 3mal reichlich Blut im kleinen Becken nachgewiesen werden. Eine ausgeprägte Schock-symptomatik trat bei 9 Patientinnen auf.

Anamnestisch wurde eine Amenorrhoe von 8 bis 73 Tagen angegeben. Bei den Fällen mit positiv nachweisbarer kindlicher Herzaktion betrug die Amenorrhoe-dauer 40 bis 71 Tage. Die Schwangerschaft mit der Amenorrhoe von 71 Tagen war eine intakte Gravidität in einem rudimentären Uterushorn. Dieses Uterushorn hatte keine Verbindung zum eigentlichen Uteruscavum. In diesem Fall kam es also zu einer Wanderung der Spermien über die gesunde Tube der einen Seite in den Douglaschen Raum und von dort gelangten die Spermien an den Fimbrientrichter der anderen Tube.

Nach der Befruchtung gelangte die Eizelle in das rudimentäre Uterushorn und wuchs dort bis zu einer beachtlichen Frucht heran. Bei der Aufnahme wies der Fet bereits einen biparietalen Kopfdurchmesser von 2,4 cm auf. Durch die bereits weit fortgeschrittene Schwangerschaft rupturierte das rudimentäre Uterushorn und die Patientin kam in schwer schockiertem Zustand an die Abteilung zur Aufnahme. Bei der durchgeführten Operation wurde das rupturierte Uterushorn und die in das Horn mündende Tube entfernt. Dieser Fall ist sicherlich ein äußerst seltenes Erscheinungsbild einer ektopen Gravidität.

Die Beta-HCG-Bestimmung war bei 40 Patientinnen (76%) positiv, bei 12 (23%) negativ, bei 4 wurde keine Bestimmung durchgeführt.

Durch die Sonographie ist sicherlich die Erkennung der EU zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt möglich als früher. Die Durchführung einer tubenerhaltenden Operation ist wesentlich erleichtert.

Von unseren 56 Fällen konnte bei 31 (55%) eine konservative Tubariaoperation durchgeführt werden. Diese Zahl ließe sich erhöhen bei Frauen mit keinem weiteren Kinderwunsch; es wurde trotz günstigem Operationssitus die unilaterale Tubektomie mit häufiger Unterbringung nach Pomeroy der anderen Seite durchgeführt.

Abschließend sei noch zu betonen, daß durch die zum heutigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden wesentlich besseren Geräte und die dazugehörigen Schallsonden, hier sei die Verwendung der intravaginalen Sektorpanoramasonde erwähnt, der Nachweis der vorhin genannten Kriterien für die Extrauterin-gravidität wesentlich öfter gelingt.