Fertilität nach konservativer Operation von nichtrupturierten Tubargraviditäten – 15 Jahre Erfahrung

R.		Langer
A.		Raziel
R.		Ron-El
A.		Golan
I.		Bukovsky
E.		Caspi

Department of Obstetrics and Gynecology, Assaf Harofeh Medical Center, Affiliated to Sackler School of Medicine, Tel Aviv University, Israel

Durch eine verbesserte Diagnostik wurden in den letzten Jahren Tubargraviditäten wesentlich früher erkannt; dies eröffnete in vielen Fällen die Möglichkeit einer organerhaltenden chirurgischen Behandlung. In dieser Studie wurde die spätere Fertilität von 118 Patientinnen nach Salpingotomie oder «milking» einer Tubargravidität retrospektiv bestimmt. Es traten insgesamt 142 nachfolgende Schwangerschaften auf. 127 waren normale intrauterine Konzeptionen (89,4%) bei insgesamt 83 Patientinnen (70,3%). Die Wiederholungsrate einer Tubargravidität in diesem Kollektiv wurde mit 12,7% angegeben. Von 65 Patientinnen mit einer normalen kontralateralen Tube hatten 53 (81,5) später eine normale intrauterine Schwangerschaft, 76,1 % ein lebendes Kind und 7,7% eine erneute Tubargravidität. 57% der Patientinnen mit nur einer Tube wiesen nachfolgend eine erfolgreiche intrauterine Konzeption auf, 47,6% hatten ein lebendes Kind. Die Wiederholungsrate der Tubargravidität in dieser Gruppe war 28,5%. Die Patientinnen,

Kurzfassungen von Zeitschriftenartikeln

41

deren Tubargravidität durch «milking» therapiert wurde, wiesen später zu 60,6% eine intrauterine Konzeption auf, 57,5 % gebaren ein lebendes Kind; eine erneute Tubargravidität trat in dieser Untergruppe nicht auf. Während man in anderen Studien immer wieder eine entscheidende Einschränkung der späteren Fertilität nach konservierenden Operationen am Eileiter feststellte, zeigt diese Studie wesentlich bessere Resultate im Hinblick auf Frauen mit weiter bestehendem Kinderwunsch. Die Aussage über die spätere Fertilität ist jedoch insgesamt schwierig, da diese von sehr vielen Faktoren, wie beispielsweise von der Art der durchgeführten Operation, von zusätzlich bestehenden Adhäsionen, späteren Infertilitätsbehandlungen usw., abhängig ist.

Für die Klinik: Trotz einer Reduktion des operativen Eingriffes bei laparoskopischer oder medikamentöser Therapie der Tubargravidität sollten sich klarerweise diese neueren Verfahren mit der Fertilitätsrate bei «klassischem» operativem Vorgehen messen.

Ch. Egarter, Wien

Aus: Fertil Steril 1990;53:486-489 cit. Gynäkol Rundsch 1991;31:41-42

Stimulation mit hohen Dosen follikelstimulierenden Hormons zu Beginn des Zyklus führt zu keiner Verbesserung der Fertilisationsrate bei «Low-responder»-Patientinnen

High-Dose Follicle-Stimulating Hormone Stimulation at the Onset of the Menstrual Cycle Does Not Improve the in vitro Fertilization Outcome in Low-Responder Patients

Vishvanath C. Karande, Georgeanna S. Jones, Lucinda L. Veeck,
Suheil J. Muasher

The Howard and Georgeanna Jones Institute for Reproductive Medicine,
Department of Obstetrics and Gynecology, Eastern Virginia Medical School,
Norfolk, Va., USA

In dieser Arbeit wird über insgesamt 34 Patientinnen berichtet, welche als sogenannte «low responder» im Rahmen des In-vitro-Fertilisations(IVF)-Programms bereits zu Beginn des Zyklus hohe Dosen follikelstimulierenden Hormons (FSH) erhielten.

Als «low responder» wurden jene Patientinnen definiert, welche in einem vorangegangenen Zyklus trotz Stimulation eine Östradiol(E2)-Konzentration unter 300 pg/ml aufwiesen bzw. eine FSH-Konzentration von über 15 mIE/ml am 3. Tag eines unstimulierten Zyklus zeigten.

17 der insgesamt 34 Patientinnen erhielten bereits ab dem 1. Zyklustag, die anderen 17 ab dem 2. Zyklustag täglich 6 Ampullen FSH intramuskulär. Nach 2 bzw. 3 Tagen wurde die FSH-Dosis, abhängig von der E2-Konzentration und der Ultraschallfollikulometrie, von 6 auf 4 bzw. 2 Ampullen reduziert. Die Verabreichung von humanem Choriongonadotropin (hCG) zur Induktion der Ovulation. Reproductive Outcome after Conservative Surgery for Unruptured Tubal Pregnancy -A 15-Year Experience