Lymphknotenmetastasen beim lobulären Mammakarzinom – eine immunhistochemische Studie

A.		Lee ^a
Ch.		Kainz ^a
L.		Danihel ^b
G.		Gitsch ^a
Ch.		Dadak ^a
G.		Breitenecker ^c

^aII. Univers.-Frauenklinik Wien (Vorst.: Prof. Dr. H. Janisch) ^bInstitut für Pathologie Universität Preßburg, CSFR ^cInstitut für pathol. Anatomie Abt. f. Gynäko-Pathologie Univers. Wien

Dr. A. Lee, II. Univers.-Frauenklinik, Spitalgasse 23, A-1090 Wien

Der entscheidendste unabhängige, die Prognose beeinflussende Faktor beim operablen Brustkarzinom ist das Vorhandensein von Lymphknotenmetastasen. In der histologischen Routineuntersuchung erweist sich speziell beim lobulären Mammakarzinom die Differenzierung zwischen Tumorzellen und gutartigen Zellen wegen der histologischen Ähnlichkeit als schwierig [1, 2],

Bisherige Untersuchungen über die Bedeutung eines immunhisto-chemischen Nachweises von Tumorzellen ergaben widersprüchliche Ergebnisse [3, 4].

Unsere Untersuchung diente der Evaluierung der Sensitivität immunhistochemischer Methoden bei der Suche nach Lymphknotenmetastasen, die bei der histopathologischen Untersuchung als negativ befundet worden waren.

Patienten und Methoden

Es wurden 22 Patienten, die im Zeitraum zwischen 1984 und 1990 mit lobulären Mammakarzinom Stadium T2 an unserer Klinik operiert wurden, untersucht. Die histologische Routineuntersuchung an mehreren Lymphknoten (median 12.1; minimum 5, maximum 19) in 3 bis 5 Ebenen pro Lymphknoten mit Hämatoxylin/Eosin Färbung ergab keinen Hinweis auf Metastasierung.

Die immunhistochemische Markierung wurde mit monoklonalen Antikörpern AE1/AE3 durchgeführt. Eine Voruntersuchung an 20 durch konventioneller histologischer Untersuchung als positiv verifizierten Lymphknoten mit 3 unterschiedlichen monoklonaler Antikörpern gegen Zytokeratine ergab bei den Marker AE1/AE3 (Boehringer Mannheim, Mannheim, FRG) im Vergleich zu 5D3 (BioGenex Lab., San Ramon, USA) und HMW (Enzo, New York, USA) die intensivsten Farbreaktionen.

Zur positiven Kontrolle wurde Tumorgewebe jeder Patientin gleichzeitig immunhistochemisch mituntersucht.

Ergebnisse

In einem Fall konnte ein subkapsulärer Tumorembolus im Rand-sinus eines Lymphknoten nachgewiesen werden. Die 3 Jahreskontrollen der Patientin nach modifizierter Mastektomie und postoperativer Chemotherapie ergab einen unauffälligen Befund.

Diskussion

Mit immunhistochemischen Färbungen können Metastasierungen und Tumorzellenemboli auch bei histologisch negativen Ergebnissen nachgewiesen werden. Beim lobulären Mammakarzinom wird eine höhere Rate von Mikrometastasen als beim duktalen Mammakarzinom angenommen [2, 3, 4], ebenso eine frühzeitige Neigung zur Metastasierung. Die prognostische Bedeutung von Mikrometastasen scheint gering zu sein [5]. Auch in unserer Studie konnte nur ein Fall nachgewiesen werden, sodaß eine Beurteilung der Prognose nicht möglich ist. In der Routine erweist sich die sorgfältige histologische Untersuchung in mehreren Schnittebenen als ausreichend.

Zusammenfassung

Es wurde eine immunhistochemische Untersuchung der axillären Lymphknoten von 22 Patienten, die wegen eines lobulären Brustkarzinoms mit Figo T2 primär operiert wurden, zum Nachweis von Metastasen durchgeführt. Alle 226 Lymphknoten ergaben bei der histologischen Routineuntersuchung einen unauffälligen Befund. Der Nachweis eines Tumorzellenembolus gelang mit dem sensitivsten Marker AE1/AE3 in einem Fall.

Literatur

Sloane JP, Ormerod MG, Imrie SF, Coobes RC: The use of antisera to epithelial membrane antigen in detecting micrometastasis in histological sections. Br J Cancer 42: 392-395, 1980.
Wells CA, Heryet A, Brochier J, Gatter KC, Mason DY: The immunocytochemical detection of axillary micrometastasis in breast cancer. Br J Cancer 50: 193-197, 1984.
Trojani M, de Mascarel I, Bonichon F, Coindre JM, Delsol G: Micrometastasis to axillary lymph nodes from carcinoma of the breast: Detection by immunohistochemistry and prognostic significance. Br J Cancer 55: 303-306, 1987.
Stosiek P, Kasper M, Karsten U, Goertchen R: Detection of cancer metastases in regional lymph nodes: Comparative histological and immunohistological investigation with the broad range anticytokeratin monoclonal antibody A45-B/B3. Neoplasma 38: 43-47, 1991.
Wilkinson EJ, Hause LL, Kuzma JF, Rothwell DJ, Donegan WL: Occult axillary lymph node metastasis in patients with invasive breast carcinoma. Lab Invest 44: 83, 1981.