Pränatale Therapiemöglichkeiten beim Non-Immun-Hydrops (NIHF)

E.		Kainer ^a
J.		Stein ^b
N.		Adelwöhrer ^a
J.W.		Dudenhausen ^c

^aGeburtsh.-gynäkol. Univers.-Klinik Graz (Vorst.: Prof. Dr. R. Winter)

^bUniversitätskinderklinik Graz ^cFU Berlin RVK-C Abteilung für Geburtsmedizin

Dr. F. Kainer, Geburtsh.-gynäkol. Univers.-Klinik, Auenbruggerplatz 14, A-8036 Graz

Die sonographische Diagnose des Non-Immun-Hydrops fetalis (NIHF) ist aufgrund der gut darstellbaren Flüssigkeitsansammlungen einfach. Durch eine umfassende prä- und postnatale Diagnostik kann in 80 % eine Ursache für die Erkrankung gefunden werden [1]. Die Gesamtüberlebensrate wird mit etwa 20 % angegeben, wobei die Prognose ganz entscheidend von der Grundkrankheit abhängig ist [2]. Die pränatalen therapeutischen Möglichkeiten sind begrenzt, in ausgewählten Fällen jedoch sehr effizient [3, 4]. Im Folgenden wird die Therapie bei 8 Fällen dargestellt.

Patienten und Methode

Im Zeitraum zwischen 1982-1991 beobachteten wir 61 Fälle von Non-immun-Hydrops (NIHF). Neben der Abklärung der mütterlichen Serologie wurde seit 1986 zunehmend auch die Untersuchung des fetalen Blutes (Nabelschnurpunktion) zur Diagnostik herangezogen. In 8 Fällen wurde ein Therapieversuch durchgeführt.

Ergebnisse

In 10 Fällen kam es zur spontanen Rückbildung der Flüssigkeitsansammlungen. 43 Fälle endeten mit dem Absterben der Frucht, oder die Kinder verstarben postpartal. Ein Therapieversuch wurde in 8 Fällen durchgeführt.

Eine Digitalisierung wurde 4mal durchgeführt. Alle 3 Kinder mit tachykarder Rhythmusstörung überlebten. Bei einer Zwillingsschwangerschaft wurde mit 24 SSW ein ausgeprägter Hydrops beider Feten festgestellt. Nach Digitalisierung kam es zur Rückbildung des Hydrops. Ein Kind überlebte nach Schnittentbindung mit 32 SSW, der zweite Zwilling verstarb an einer Lungenhypoplasie.

Ein Fet mit NIHF und Lungentumor wurde mit 32 SSW bei ausgeprägtem Hydrothorax zweimal mit einer intrauterinen Katheter-einlage behandelt. Nach Entbindung mit 36 SSW entwickelte sich das Kind nach operativer Entfernung des Lungensequesters problemlos.

Zweimal wurde unmittelbar präpartal ein Hydrothorax abpunktiert. Ein Kind überlebte (Chylothorax). Das zweite Kind (generalisierter Hydrops) verstarb unmittelbar postpartal.

Ein Fet mit Parvovirusinfektion und Anämie (Hb 2,6 g%) wurde mit 23 SSW intrauterin 3mal transfundiert. Der Hydrops bildete sich nach jeder Transfusion innerhalb von 2 Tagen zurück. Nach vorzeitigem Blasensprung mit 28 SSW kam es zur Amnioninfektion. Das Kind verstarb an einer Sepsis.

Diskussion

Bei 8 Schwangerschaften mit NIHF und intrauteriner Therapie überlebten 6 Kinder. Werden prognostisch günstige Fälle optimal behandelt, so ist auch bei diesem schweren Krankheitsbild mit einer guten Prognose zu rechnen.

Zusammenfassung

Die Diagnose eines NIHF ist sonographisch einfach. Schwierig ist eine exakte Differentialdiagnose. Die therapeutischen Möglichkeiten beim NIHF sind im Gegensatz zum immunologischen Hydrops als wesentlich schlechter einzustufen. Neben der medikamentösen Behandlung des Feten über die Mutter, stehen direkte Therapiemaßnahmen am Feten wie Punktionen, intrauterine Kathetereinlagen sowie intrauterine Transfusionen zur Verfügung. Die Therapiemöglichkeiten werden anhand von 8 Fallbeispielen dargestellt.

Literatur

Holzgrevé W, Curry CJR, Golbus MS, Callen PW, Filly RA, Smith JC: Investigation of nonimmune hydrops fetalis. Am J Obstet Gynecol 1984; 150: 805-812.

Hansmann M, Gembruch U, Bald R: New therapeutic aspects in nonimmune hydrops fetalis based on four hundred and two prenatally diagnosed cases. Fetal Ther 1989; 4: 29-36. Maeda H, Shimokawa H, Nakano H: Effects of intrauterine treatment on nonimmunologic hydrops fetalis. Fetal Ther 1988; 3: 198-209.

Stewart PA, Wladimiroff JE: Cardiac tachyarrhythmia in the fetus: Diagnosis, treatment and prognosis. Fetal Ther 1987; 2: 7-16.