Die Wirksamkeit der antenatalen Kortikosteroidtherapie auf die fetale Organreife: Behandlungsempfehlungen der Österreichischen Gesellschaft für Prä- und Perinatale Medizin

A.	Arnold	Pollak ^a
W.	Walter	Gruber ^b
P.	Peter	Husslein ^c

^aAbteilung für Neonatologie, angeborene Störungen und Intensivmedizin, **Universitäts-Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde**, ^bAbteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie, **Kaiser-Franz-Josef-Spital** der Stadt Wien, ^cAbteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie, **Universitätsklinik für Frauenheilkunde**, Wien, Österreich

Univ.-Prof. Dr. Arnold Pollak, Leiter der Abteilung für Neonatologie, angeborene Störungen und Intensivmedizin, Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde Wien, Währinger Gürtel 18-20, A-1090 Wien (Österreich), Tel. +43 1 40 400 3224, Fax +43 1 40 400 3296, E-Mail arnold.pollak@akh-wien.ac.at

Atemnotsyndrom (RDS) und intraventrikuläre Blutungen (IVH) sind nach wie vor die häufigsten Ursachen von neonataler Mortalität, Morbidität und Säuglingssterblichkeit. Die Kortikosteroidtherapie zur Induktion der fetalen Lungenreife wurde erstmals 1972 eingeführt [3]. Seit damals sind mindestens 15 kontrollierte, prospektive, randomisierte klinische Studien und eine Vielzahl von Anwendungsbeobachtungen durchgeführt worden. Frühgeborene, deren Mutter mit Steroiden vor der Geburt behandelt werden, entwickeln seltener bzw. leichtere Formen eines RDS und seltener dessen Komplikationen wie IVH [1]. Es gibt nur wenige vergleichbare pränatale Therapien, die so umfassend studiert, dokumentiert, und deren Wirksamkeit wissenschaftlich so eindeutig belegt und auch weltweit akzeptiert sind. Dennoch werden weiterhin viel zu wenige der in Frage kommenden Schwangeren entsprechend behandelt, die Zahlen schwanken international zwischen weniger als 20 bis 60%. Einer Untersuchung an 500 Perinatalzentren der USA ergab, dass nur 12-18% der Frauen mit Frühgeburten von 500 bis 1500 g Geburtsgewicht antenatal mit Steroiden behandelt wurden [4]. Aus Österreich liegen keine verlässlichen Gesamtzahlen vor.

Aufgrund dieser viel zu niedrigen Behandlungsfrequenz einerseits, des eindeutigen Benefits für das Kind und der unterschiedlichen Handhabung dieser Therapie andererseits wird in der Literatur die Erstellung von Behandlungsempfehlungen bzw. Richtlinien als dringlich gefordert [2, 5].

Empfehlungen zur Behandlung mit antenatalen Steroiden

Die Wirksamkeit der antenatalen Steroidtherapie bei drohender Frühgeburt übertrifft bei weitem jedes potentielle Nebenwirkungsrisiko und führt zu einer signifikanten Abnahme von RDS, IVH und Mortalität.

Alle Feten zwischen der 24. und 34. Schwangerschaftswoche, bei denen eine drohende Frühgeburt besteht, sind potentielle Kandidaten für eine Steroidtherapie.

Weder Geschlecht noch ethnische Zugehörigkeit oder die Möglichkeit einer postnatalen Surfactanttherapie stellen eine Einschränkung in der Behandlungsindikation dar.

Alle Schwangeren, die eine tokolytische Therapie erhalten, sollten gleichzeitig auch mit Steroiden behandelt werden.

Die Behandlung besteht aus 2×12 mg Betamethason i.m. im Abstand von 24 h. Das Wirkungsoptimum der Behandlung beginnt 24 h nach Abschluss der Behandlung und dauert 7 Tage.

Da die Behandlung mit Steroiden für weniger als 24 h ebenfalls mit einer signifikanten Abnahme der neonatalen Mortalität, RDS und IVH einhergeht, sollte diese Therapie bei drohender Frühgeburt in jedem Fall eingesetzt werden, es sei denn, die Geburt steht unmittelbar bevor. Bei vorzeitigem Blasensprung sollten Steroide besonders wegen des protektiven Effektes bezüglich IVH eingesetzt werden.

8. Auch bei Schwangerschaftskomplikationen (z.B. Diabetes, Präeklampsie etc.) mit drohender Frühgeburt vor der vollendeten 34. Schwangerschaftswoche sollten Steroide verwendet werden, es sei denn, es besteht von seiten der mütterlichen Grunderkrankung eine Kontraindikation bzw. die Geburt steht unmittelbar bevor.

Kommentare

ad 1. Eine Metaanalyse von 15 kontrollierten, randomisierten Studien [1] ergab eine signifikante Abnahme des RDS mit einer typischen Odds-ratio von 0,5 (95% CI = 0,4-0,6), der neonatalen Mortalität mit einer Odds-ratio von 0,6 (95% CI = 0,5-0,8) und eine signifikante Abnahme von IVH mit einer Odds-ratio von 0,5 (95% CI = 0,3-0,9). Andere assoziierte Morbiditäten wie nekrotisierende Enterokolitis, offener Ductus Botalli und bronchopulmonale Dysplasie werden in der Literatur kontroversiell beurteilt.

ad 2. Es gibt in der Literatur zu wenige gesicherte Angaben über die Wirkung der antenatalen Steroidtherapie bei Schwangerschaften mit weniger als 24 bzw. mehr als 34 Schwangerschaftswochen. Nach der 34. Schwangerschaftswoche besteht wegen des relativ geringen Risikos von Mortalität, RDS und IVH keine Indikation zur Steroidtherapie mehr – ausser bei nachgewiesener Lungenunreife. Es bestehen allerdings derzeit keine Kontraindikationen, Steroide auch vor der 24. Schwangerschaftswoche einzusetzen.

ad 3. Die postpartale Surfactant-Therapie und die pränatale Steroidtherapie ergänzen und potenzieren einander in ihrer Wirksamkeit bezüglich RDS und neonataler Mortalität.

KARGER

E-Mail karger@karger.ch Fax+ 41 61 306 12 34 <http://www.karger.ch>

© 1997 S. Karger AG, Basel

Tel. +43 1 40 400 3224, Fax +43 1 40 400 3296, E-Mail arnold.pollak@akh-wien.ac.at

ad 4. Bei gleichzeitiger Verabreichung von Steroiden und Tokolytika wurde das Vorkommen von Lungenödem bei Schwangeren beschrieben. Diese Komplikation trat vor allem bei Bestehen einer mütterlichen Infektion, Flüssigkeitsüberladung und Mehrlingsschwangerschaften auf. Lungenödem wurde bei alleiniger Kortikosteroidmedikation nicht beobachtet.

ad 5. Dexamethason und Betamethason werden für die Therapie bevorzugt. Beide haben identische biologische Aktivität und passieren gleichermassen die Plazentaschranke. Sie haben nahezu keine Mineralokortikoidaktivität, eine nur geringe immunsupprimierende Wirkung und längere Wirkungsdauer als Cortisol und Methylprednisolon. Ausserdem sind Dexamethason und

Betamethason am besten untersucht und dokumentiert. Die vorgeschlagene Dosierung wurde zunächst arbiträr gewählt, stellte sich aber als effektiv und wirkungs-voll heraus. Es werden adequate fetale Plasmaspiegel erzielt, die den physiologischen Stresskonzentrationen von Cortisol, gemessen post partum bei unbehandelten Frühgeborenen mit RDS, entsprechen. Mit den empfohlenen Dosierungsrichtlinien werden etwa 75% der Kortikosteroidrezeptoren abgesättigt, wodurch ein nahezu maxima-ler Effekt erzielbar ist. Höhere oder häufigere Dosierungen dürften keine zusätzlichen Vorteile bieten, eventuell aber das Nebenwir-kungsrisiko erhöhen. Die Effektivität niedriger Dosierungen ist nicht belegt. Desgleichen ist die Wirksamkeit 7 Tage nach Behandlungsbe-ginn ungeklärt, ebenso wie der Benefit bzw. die Nebenwirkungen von Wiederholungstherapien nach 7 Tagen.

ad 6. Auch bei inkompletter Therapie (d.h. Geburt vor Vollen-dung der ersten 24 h nach Therapie) ist die Wirksamkeit auf das neonatale Outcome in Studien belegt.

ad 7. Bei Vorliegen eines vorzeitigen Blasensprunges kommt es nach Steroidmedikation ebenfalls zu einer Abnahme von RDS und IVH sowie zu einer Verbesserung der neonatalen Überlebensrate. Der Effekt ist allerdings geringer als bei intakter Fruchtblase. Es ist nicht eindeutig geklärt, ob sich dabei das mütterliche und/oder neonatale Infektionsrisiko erhöht. Jedenfalls ist das Risiko bezüglich IVH und neonatale Mortalität höher als das Infektionsrisiko einzu-schätzen [4].

ad 8. Bei insulinpflichtigen Diabetikerinnen kann sich die Diabe-teseinstellung vorübergehend schwieriger gestalten, weshalb die In-sulintherapie entsprechend anzupassen ist. Die erste randomisierte Studie bei Schwangeren mit Hypertension ergab ein erhöhtes Risiko für intrauterinen Fruchttod nach Steroidtherapie. Nachfolgende Studien konnten dies allerdings nicht bestätigen.

Nebenwirkungen

Aufgrund der bisher publizierten Daten kommt es bei behandel-ten Kindern weder zu einer signifikanten Zunahme an Spätinfektio-nen noch zu einer klinisch relevanten Beeinträchtigung der Neben-nierenrindenfunktion. Nachuntersuchungen bis zum 12. Lebensjahr konnten bei deutlich verbesserter Überlebensrate keinerlei entwick-lungsneurologische, kognitive oder psychische Langzeitschäden auf-zeigen. Die im Tierversuch beobachtet en entwicklungsneurologi-schen Komplikationen entstammten Studien, bei denen vergleichs-weise eine 10fach höhere Steroidmedikation verwendet wurde. Spät-effekte auf Wachstum und Pubertät wurden bis dato nicht beschrieben.

Kosten-IMutzen-Berechnung

Der Einsatz der antenatalen Kortikosteroidtherapie führt zu einer bedeutenden Senkung der Gesundheitskosten. Nach Berech-nungen aus den USA [4] beträgt die Kostenreduktion pro behandel-ten Patienten über US\$ 3000, auf Österreich übertragen hiesse das in etwa eine jährliche Einsparung von zirka 30-40 Millionen Schilling unter der Annahme einer etwa 60%igen landesweiten Behandlungs-frequenz. Die Anwendung von Kortikosteroiden zur Induktion der Lungenreife ist ein selten klares Beispiel für eine relativ einfache the-rapeutische Intervention, die neben substantiellem Benefit für das Kind auch entsprechend kostensparend wirksam ist.

Literatur

Crowley P, Chalmers I, Keirse MJNC: The effects of corticosteroid administration before preterm delivery: An overview of the evidence from controlled trials. Br J Obstet Gynaecol 1990;97:11-25.

Horbar JD: Antenatal corticosteroid treatment and neonatal outcomes for infants 501– 1500 gm in the Vermont-Oxford-Trials Network. Am J Obstet Gynecol 1995;173:275-281.

Liggins GC, Howie RN: A controlled trial of antepartum glucocorticoid treatment for prevention of the respiratory distress syndrome in premature infants. Pediatrics 1972;50:515-520.

NIH Consensus Development Conference on the Effect of Corticosteroids for Fetal Maturation on Perinatal Outcomes (NIH publication No 95-3784). Bethesda, National Institutes of Health, 1994, pp 53-57. Wright LL, Horbar JD, Gunkel H, Verier J, Younes N, Andrews EB, Long W: Evidence from multicenter networks on the current use and effectiveness of antenatal corticosteroids in low birth weight infants. Am J Obstet Gynecol 1995;173:263-269.

Gynäkol Geburtshilfliche Rundsch 1997;37:71-72

Pollak/Gruber/Husslein