Considerations sur l'importance actuelle des Staphylococcies en oto-rhino-laryngologie

G.

Terrier

Clinique ORL, Lausanne

Discussion sur le problème de l'épidémiologie et de la thérapeutique des staphylococcies. Il semble que les services hospitaliers constituent, par le nombre d'individus et d'infections qu'ils concentrent, un milieu favorable à l'essaimage bactérien et par conséquent à la propagation des staphylocoques. Cependant, dans le service ORL de Lausanne, il n'a pas été constaté, par la fréquence des porteurs de staphylocoques ou par la proportion des résistances aux antibiotiques, de différences sensibles entre les malades hospitalisés et ceux qui ne l'étaient pas. La responsabilité prédominante du personnel infirmier comme agent vecteur d'infections croisées n'a pas pu être démontrée non plus de façon convaincante.

La question de l'utilité des antibiogrammes en thérapeutique anti-staphylococcique a aussi été soulevée. Ces tests rendent certes de grands services dans les infections graves et rebelles mais il n'est peut-être pas nécessaire, dans la plupart des staphylococcies ORL, de se conformer à tout prix à leurs directives et de prescrire ainsi souvent d'emblée un antibiotique de réserve (chloromycétine, auréo-mycine, terramycine, etc.), qu'il faudrait pouvoir ménager, avant même d'avoir essayé des sulfamides ou des antibiotiques usuels. Ces derniers, même s'ils sont trouvés résistants en laboratoire, peuvent être encore cliniquement actifs, surtout en combinaisons médicamenteuses synergiques ou en association avec de la radio-thérapie ou des mesures chirurgicales.

Paraîtra plus tard in extenso dans cette Revue.

Diskussion.

Escher fragt, ob bei erkannten Staphylokokkenträgern, ähnlich wie bei Diphtherieträgern, die Tonsillektomie ausgeführt worden ist. Bei einer Haus-epidemie mit penicillinresistenten Staphylokokken wurden häufig die Tonsillen infiziert gefunden.

Secretan sah in letzter Zeit häufige Osteomyelitis des Oberkiefers bei Säuglingen im Zusammenhang mit Staphylokokkeninfektionen.

Rüedi: In Holland hat man auch schwere Staphylokokkeninfekte als Folge von Antibiotikumverwendung gefunden (Chirurgenkrankheit). Die natürliche Resistenz der Haut gegen solche Infekte scheint abzunehmen. Örtliche Staphylo-dermien führen zu Allergien, die lokal begrenzt sind. Jede Schub hinterläßt nur sehr kurze Immunität.

Terrier: Tonsillektomien wegen Staphylokokken-Trägertum mußten wir

252 Gesellschaft Schweiz. Hals-, Nasen- und Ohrenärzte

nicht vornehmen, da wir keine Endemien beobachteten, doch sahen wir auch

Säuglingsosteomyelitis des Oberkiefers. Ein lätziges Kind erwies sich glücklicherweise als penicillinsensibel. Mit der Kombination Röntgen + Antibiotikakura sahen wir weniger Resistenz und mehr Erfolge.

Diagnostic différentiel entre le kyste du canal thyroglosse, le goitre lingual et la thyroïde linguale.

Dr P. BRUNSCHWIG, Clinique ORL, Lausanne.

Relation de 3 cas de kyste, goitre et thyroïde linguale observés dans le service ORL de l'Hôpital cantonal de Lausanne.

1° Kyste du canal thyroglosse infecté, extirpé

2° Goitre lingual extirpé également

3° Thyroïde linguale unique, laissée en place.

Rôle et importance de l'examen préalable à l'Iode radioactif, permettant de poser un diagnostic suffisamment sûr et précis pour déterminer la localisation de la glande, son état d'activité et s'il existe d'autres tissus thyroïdiens aberrants. Examen qui permet en outre d'éviter une biopsie, souvent dangereuse.

Indication opératoire posée pour le kyste du canal thyro-glosse et le goitre lingual, formellement contre-indiquée par contre dans le cas de la thyroïde linguale unique, à cause de l'apparition post-opératoire de phénomènes myxœdémateux.

Paraîtra plus tard in extenso dans cette Revue.

Contribution à l'étude des embryopathies post-rubéoleuses.

Dr J.-P. GAILLARD et Dr M. MARENDAZ, Clinique ORL, Lausanne.

Observation d'un garçon de 10 ans dont la mère a souffert durant le premier mois de sa grossesse, soit entre le 15^e et 20^e jour, d'une rubéole assez sévère. Suite de graviditas et accouchement normaux. Né à terme, l'enfant a de la peine à prospérer et l'on constate des malformations cardiaques, oculaires, dentaires et auriculaires. L'étude des malformations auriculaires a montré une sur-dité de perception bilatérale avec une élévation du seuil allant de