Photoelektrische Nystagmusregistrierung

C.R.		Pfaltz
G.R.		Richter

Ohrenklinik, Basel

Die vorliegende Arbeit beschreibt eine neue Methode, Nystagmus photoelektrisch zu registrieren. Der Aufnahmeapparat ist am Kopf des Patienten befestigt und besteht aus einem Brillengestell, welches die Lichtquelle sowie die Photozellen trägt. Durch die nystaktischen Augenbewegungen werden Intensitätsschwankungen des von der Augenoberfläche reflektierten Lichtes hervorgerufen und von den Photozellen aufgefangen. Die dort entstehenden elektrischen Impulse werden über ein abgeschirmtes Kabel einem EEG-Apparat mit üblichem Verstärker- und Schreibsystem zugeleitet und daselbst registriert.

Autoreferate

259

Die Größe der Nystagmusausschläge im Kurvenbild verhält sich proportional zur Größe der Augenbewegungen. Sie gestatten eine objektive Analyse des Nystagmus, vor allem geben sie Auskunft hinsichtlich Richtung, Frequenz, Amplitude und Dauer eines vestibulären Nystagmus. Die Vorzüge der photoelektrischen Nystagmusregistrierung gegenüber anderen Methoden liegen in der technischen Einfachheit, hohen Empfindlichkeit und vielseitigen Verwendbarkeit, welche die Möglichkeit der Erfassung sämtlicher Nystagmusarten, auch des Lagenystagmus, bietet. Erscheint in extenso auf Seite 263.

Diskussion.

Richter: Schwellenwert-Untersuchungen sind sehr wichtig. Wir sahen, daß bei diesen Untersuchungen der Lichteinfluß auch eine Rolle spielt, und verlegten daher unsere Untersuchungen in eine Dunkelkammer. Der Lichteinfluß sollte bei diesem geschilderten Verfahren noch reduziert werden.

Pfaltz: Mit Infrarotfiltern kann man diesen Faktor ausschalten.

Angeborene äußere Nasendeformitäten und ihre Behandlung. Dr. R. MEYER, St. Gallen.

Es werden Fälle von Fehlbildungen der Nase aus der Praxis gezeigt. Nasenfisteln bleiben unberücksichtigt, da ihre Korrektur keine interessanten Probleme bietet. Von einem sehr seltenen Fall von Proboscis lateralis bei einem Säugling mit Atresie der rechten Nasenseite wird uns das einzig bekannte Korrekturverfahren von Forrest Young gezeigt. Das im Bild gezeigte Kind ist noch nicht operiert. Ein Fall von Dysplasie der äußeren und inneren Nase mit starkem Hypertelorismus und einem großen Lipom, das die ganze Nasengegend einnimmt und die Nasenlöcher weit auseinanderdrängt, und mit einer wabig-knöchernen Auftreibung der Scheidewand bei Einsenkung der vorderen Schädelgrube im Bereich der Lamina cribrosa konnte nach mehreren Eingriffen zu einem befriedigenden funktionellen und ästhetischen Resultat geführt werden. Ein extremer Fall von Doggenase mit weit auseinanderstehenden Orbitae und starker Wölbung der Nasenknochen sowie der dreieckigen Knorpel wurde in zwei Sitzungen korrigiert. Bei einem Kind mit Flachnase bei Fehlen der Nasenknochen wurde vorläufig